Establecimiento de Jorge Luis Bianchi

Ubicación	Colonia Jefferies, Treinta y Tres
Superficie	232 ha de suelo
Sistema productivo	Ciclo completo
Base forrajera	Campo natural mejorado

El establecimiento está dedicado exclusivamente a la invernada de novillos, que se realiza desde este año por razones estratégicas-comerciales del negocio. Se invernan novillos con más de dos años terminados gordos y pesados para frigorífico.
El establecimiento tiene una superficie de 232 ha de un suelo con un largo historial agrícola.
Los suelos del establecimiento son del tipo suelos 12.



Los campos fueron chacras antiguamente, deficientes en minerales tanto de fósforo como potasio.

Mediante un plan de siembra y fertilización aplicado se va recuperando la fertilidad del mismo utilizando técnicas de monitoreo como forma de constatar el cumplimiento de las metas.
El 100% de la superficie está mejorada con los géneros Lotus, como el Maku, el Lotus Trojan, (pedunculatus igual que el Maku tetraploide), Lotus Tanin (pedunculatus con más semillazón que el Maku), y el Lotus rincón. Parte de las zonas con blanqueales en la cual el rincón le ha dado una gran mejora productiva. Además de las leguminosas, han aparecido gramíneas como

Raigrás, Bromus, Poas y especies perennes sembradas como el Holcus y el Paspalum de forma natural.
El pico de producción de pasto es de primavera-verano. Con veranos lluviosos, la producción forrajera continúa extendida. Una vez que el rincón disminuye la producción en verano, el Maku comienza a sustituir el aporte.
El sistema establecido, tiene 5 años, con cada vez mas gramíneas. La gramilla no es un problema. El Paspalum, notatum así como dilatatum, ocupa el lugar dejado por el rincón.
Con estas pasturas sembradas sobre suelos degradadados y estructuras compactadas, se pasa rotativa como forma de devolver materia orgánica al suelo dos veces al año. Esa materia orgánica sumado al agregado de fósforo y en alguna situación potasio, ha logrado pasturas en coberturas de gran potencial primavero-estival-otoño.

Foto 1. Pasturas de Lotus Maku, previo a entrada de novillos.

Manejo animal

El campo lleva unos 190 novillos teniendo en cuenta que podría venir una seca en verano. La extracción es un 100%.

Los ganados se manejan en rotación por lotes (4-5 lotes), de acuerdo al momento de compra. Las fracciones son rotadas cada 5 días. Las pasturas son cerradas durante los meses de junio-julio. La reposición de ganado recién se realiza desde el mes de agosto, terminando de engordar los últimos lotes en el mes de mayo.

Bajo esta relación flaco gordo en que el flaco supera en un 28% al gordo, la invernada es realizada partiendo de un novillo que realice una rápida conversión del pasto en carne. Ese novillo debe tener buena calidad genética y a su vez tener la capacidad de cargar muchos kg para transformarse. El año pasado produjeron entre 160-170 kg producidos por ha. Este año se superará. Un primer lote de novillos se estaría embarcando en el mes de noviembre.

Foto 2. Primer lote de novillos a un mes de embarque.