

Evolución y análisis mensual de indicadores prediales del Programa Procría perteneciente al mes de setiembre de 2026.



Informe elaborado por el
Plan Agropecuario en
base a datos de **S-Procría**

Panorama comparativo a nivel nacional

En setiembre se mantiene el ajuste de la base forrajera a nivel nacional. La altura media del campo natural baja de 5,0 a 4,5 cm, mientras la condición corporal desciende de 3,8 a 3,8. La oferta forrajera se mantiene prácticamente estable en torno a 3,5 KgMS/Kg PV y la carga animal se ubica en 0,83 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas aumenta a 279 kg y el de terneras a 205 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubica en 21,3% de los predios con respuesta válida.


Indicador	Agosto	Setiembre	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	5,0	4,5	-0,5	-9,3%	cm
Condición corporal	3,8	3,8	-0,1	-1,7%	
Oferta forrajera	3,4	3,5	0,0	0,6%	KgMS/Kg PV
Carga animal	0,82	0,83	0,00	0,6%	UG/ha
Peso vaquillonas	271	279	7	2,7%	kg
Peso terneras	188	205	17	9,1%	kg
Impacto garrapata	20,7	21,3	0,6	p.p.	% predios

Disponibilidad de campo natural







La disponibilidad de campo natural muestra una caída sostenida desde el invierno hacia setiembre. Aumenta la proporción de predios en rangos bajos de altura, consolidando una señal de restricción forrajera al inicio de la primavera.

Condición corporal de vacas de cría



La condición corporal nacional se debilita hacia setiembre, con descenso de la media y aumento relativo de los predios con vacas por debajo de 3,5. La señal requiere atención para no ingresar a la primavera con pérdida adicional de estado.

Oferta de forraje, carga animal, pesos e impacto de garrapata



La oferta forrajera se estabiliza en setiembre, mientras la carga animal cambia poco. Los pesos de recría muestran mejora, especialmente en terneras, y el impacto medio y alto de garrapata se mantiene cercano al registro de agosto.

Detalle mensual de disponibilidad de campo natural

Mes	Altura (cm)	<3 cm	3-<5 cm	5-<9 cm	≥9 cm
Enero	7,09	9%	19%	50%	23%
Febrero	7,10	8%	26%	39%	27%
Marzo	7,28	10%	21%	41%	27%
Abril	7,64	4%	17%	50%	28%
Mayo	7,40	3%	19%	51%	27%
Junio	6,06	10%	27%	49%	14%
Julio	5,54	9%	37%	46%	8%
Agosto	4,98	17%	37%	41%	5%
Setiembre	4,51	25%	38%	34%	4%

Detalle mensual de condición corporal

Mes	Condición corporal	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	4,00	14%	25%	61%
Febrero	3,95	12%	31%	57%
Marzo	3,98	11%	30%	58%
Abril	4,06	9%	27%	65%
Mayo	4,09	8%	21%	71%
Junio	4,05	7%	26%	67%
Julio	3,94	11%	32%	57%
Agosto	3,85	15%	36%	49%
Setiembre	3,78	23%	36%	42%

Detalle mensual de oferta forrajera y carga animal

Mes	Oferta Forrajera (kgMS/Kg PV)	<3	3-<5	≥5	Carga animal UG/ha
Enero	4,43	22%	43%	35%	0,92
Febrero	4,01	32%	30%	38%	0,93
Marzo	4,37	29%	28%	43%	0,90
Abril	5,01	19%	30%	50%	0,87
Mayo	4,94	18%	33%	49%	0,85
Junio	3,80	35%	33%	31%	0,85
Julio	3,65	36%	37%	27%	0,84
Agosto	3,44	41%	37%	22%	0,82
Setiembre	3,46	39%	35%	26%	0,83

Detalle mensual de recría e impacto de garrapata

Mes	Peso vaquillonas (kg)	Peso terneras (kg)	Impacto garrapata (%)
Enero	270	173	5%
Febrero	265	163	8%
Marzo	263	163	23%
Abril	270	182	29%
Mayo	269	172	31%
Junio	270	191	22%
Julio	274	187	20%
Agosto	271	188	21%
Setiembre	279	205	21%


Litoral Norte

Paysandú, Salto, Artigas y Río Negro

Indicador	Agosto	Setiembre	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	5,7	5,4	-0,3	-4,5%	cm
Condición corporal	3,8	3,8	-0,1	-1,4%	
Oferta forrajera	3,8	4,2	0,4	11,0%	KgMS/Kg PV
Carga animal	0,83	0,81	-0,01	-1,8%	UG/ha
Peso vaquillonas	273	309	35	13,0%	kg
Peso terneras	188	193	5	2,7%	kg
Impacto garrapata	21,8	25,8	4,0	p.p.	% predios

RLN cierra setiembre con altura media de campo natural de 5,4 cm (-4,5% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,8, oferta forrajera de 4,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,81 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 309 kg y el de terneras 193 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 25,8%.

Disponibilidad de campo natural




La disponibilidad de campo natural se ubica en 5,43 cm en setiembre. La distribución por rangos permite identificar la proporción de predios en situación más ajustada y el peso de los rangos intermedios.

Detalle mensual de disponibilidad de campo natural

Mes	Altura (cm)	<3 cm	3-5 cm	5-9 cm	≥9 cm
Enero	7,66	2%	24%	50%	24%
Febrero	9,14	1%	14%	37%	47%
Marzo	9,30	1%	13%	40%	45%
Abril	9,47	0%	10%	41%	49%
Mayo	8,68	1%	11%	48%	41%
Junio	7,18	1%	20%	55%	24%
Julio	6,34	1%	28%	57%	14%
Agosto	5,68	9%	34%	47%	10%
Setiembre	5,43	7%	40%	46%	7%

RLN - Evolución de indicadores

Condición corporal




La condición corporal promedio se ubica en 3,78 en setiembre. El seguimiento por rangos permite dimensionar la proporción de predios con CC menor a 3,5.

Detalle mensual de condición corporal

Mes	Condición corporal	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	4,14	6%	14%	81%
Febrero	4,21	2%	17%	81%
Marzo	4,17	5%	19%	76%
Abril	4,19	7%	12%	81%
Mayo	4,14	6%	17%	77%
Junio	4,02	5%	30%	65%
Julio	3,90	12%	31%	57%
Agosto	3,83	15%	37%	48%
Setiembre	3,78	19%	33%	47%

Oferta forrajera y carga animal




La oferta forrajera de setiembre se ubica en 4,23 KgMS/Kg PV y la carga animal en 0,81 UG/ha.

Detalle mensual de oferta forrajera y carga animal

Mes	Oferta Forrajera (KgMS/Kg PV)	<3	3-<5	≥5	Carga animal UG/ha
Enero	4,56	15%	50%	35%	0,89
Febrero	5,47	14%	29%	57%	0,88
Marzo	5,64	11%	29%	60%	0,87
Abril	6,14	12%	24%	64%	0,88
Mayo	5,60	10%	32%	58%	0,84
Junio	4,57	24%	32%	44%	0,84
Julio	4,29	27%	39%	35%	0,83
Agosto	3,81	38%	33%	29%	0,83
Setiembre	4,23	24%	37%	39%	0,81

Recría e impacto de garrapata



Detalle mensual de recría e impacto de garrapata

Mes	Peso vaquillonas (kg)	Peso terneras (kg)	Impacto garrapata (%)
Enero	258	195	15%
Febrero	263	177	12%
Marzo	262	167	30%
Abril	268	180	40%
Mayo	274	178	39%
Junio	278	187	31%
Julio	286	189	25%
Agosto	273	188	22%
Setiembre	309	193	26%


Litoral Centro

Colonia, Soriano, San José, Florida, Flores, Durazno y Canelones

Indicador	Agosto	Setiembre	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	4,4	4,1	-0,4	-7,9%	cm
Condición corporal	3,9	3,8	-0,1	-1,6%	
Oferta forrajera	3,1	3,3	0,3	8,4%	KgMS/Kg PV
Carga animal	0,86	0,89	0,03	3,5%	UG/ha
Peso vaquillonas	308	292	-16	-5,2%	kg
Peso terneras	208	232	24	11,4%	kg
Impacto garrapata	1,1	1,4	0,3	p.p.	% predios

RLC cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,1 cm (-7,9% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,8, oferta forrajera de 3,3 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,89 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 292 kg y el de terneras 232 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 1,4%.

Disponibilidad de campo natural




En RLC, la disponibilidad de campo natural se ubica en 4,08 cm en setiembre. La distribución por rangos permite identificar la proporción de predios en situación más ajustada y el peso de los rangos intermedios.

Detalle mensual de disponibilidad de campo natural

Mes	Altura (cm)	<3 cm	3-5 cm	5-9 cm	≥9 cm
Enero	7,66	7%	11%	50%	32%
Febrero	6,43	5%	30%	49%	16%
Marzo	5,52	15%	25%	54%	6%
Abril	5,93	9%	22%	63%	6%
Mayo	5,63	7%	33%	51%	9%
Junio	5,22	9%	39%	47%	6%
Julio	4,79	12%	48%	38%	2%
Agosto	4,43	24%	36%	41%	0%
Setiembre	4,08	31%	42%	26%	1%

RLC - Evolución de indicadores

Condición corporal




La condición corporal promedio se ubica en 3,85 en setiembre. El seguimiento por rangos permite dimensionar la proporción de predios con CC menor a 3,5.

Detalle mensual de condición corporal

Mes	Condición corporal	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	3,64	21%	46%	32%
Febrero	3,73	20%	45%	35%
Marzo	3,81	20%	37%	44%
Abril	4,00	14%	32%	55%
Mayo	4,12	10%	22%	68%
Junio	4,04	9%	28%	63%
Julio	3,96	12%	30%	58%
Agosto	3,91	14%	30%	56%
Setiembre	3,85	23%	35%	42%

Oferta forrajera y carga animal




La oferta forrajera de setiembre se ubica en 3,34 KgMS/Kg PV y la carga animal en 0,89 UG/ha.

Detalle mensual de oferta forrajera y carga animal

Mes	Oferta Forrajera (KgMS/Kg PV)	<3	3-<5	≥5	Carga animal UG/ha
Enero	4,81	15%	38%	46%	0,94
Febrero	4,02	25%	34%	41%	0,99
Marzo	3,69	38%	38%	25%	0,97
Abril	4,41	31%	35%	33%	0,90
Mayo	3,74	30%	41%	29%	0,90
Junio	3,23	45%	36%	19%	0,88
Julio	3,12	45%	38%	17%	0,87
Agosto	3,08	48%	36%	16%	0,86
Setiembre	3,34	43%	38%	19%	0,89

Recría e impacto de garrapata



Detalle mensual de recría e impacto de garrapata

Mes	Peso vaquillonas (kg)	Peso terneras (kg)	Impacto garrapata (%)
Enero	280	176	0%
Febrero	293	179	0%
Marzo	299	164	0%
Abril	304	184	2%
Mayo	289	174	3%
Junio	289	187	2%
Julio	281	190	1%
Agosto	308	208	1%
Setiembre	292	232	1%


Noreste

Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó

Indicador	Agosto	Setiembre	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	5,0	4,0	-1,0	-20,4%	cm
Condición corporal	3,7	3,5	-0,1	-3,5%	
Oferta forrajera	3,5	3,2	-0,3	-9,4%	KgMS/Kg PV
Carga animal	0,84	0,80	-0,03	-4,1%	UG/ha
Peso vaquillonas	242	246	4	1,7%	kg
Peso terneras	170	216	46	27,0%	kg
Impacto garrapata	36,2	33,8	-2,4	p.p.	% predios

RNE cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,0 cm (-20,4% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,5, oferta forrajera de 3,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,80 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 246 kg y el de terneras 216 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 33,8%.

Disponibilidad de campo natural




En RNE, la disponibilidad de campo natural se ubica en 3,98 cm en setiembre. La distribución por rangos permite identificar la proporción de predios en situación más ajustada y el peso de los rangos intermedios.

Detalle mensual de disponibilidad de campo natural

Mes	Altura (cm)	<3 cm	3-5 cm	5-9 cm	≥9 cm
Enero	7,18	0%	20%	60%	20%
Febrero	6,22	0%	45%	36%	18%
Marzo	7,58	2%	18%	49%	31%
Abril	8,19	2%	2%	64%	33%
Mayo	7,79	0%	14%	56%	30%
Junio	6,59	7%	18%	62%	12%
Julio	5,77	5%	46%	39%	10%
Agosto	5,01	20%	34%	42%	4%
Setiembre	3,98	38%	34%	22%	5%

RNE - Evolución de indicadores

Condición corporal




La condición corporal promedio se ubica en 3,54 en setiembre. El seguimiento por rangos permite dimensionar la proporción de predios con CC menor a 3,5.

Detalle mensual de condición corporal

Mes	Condición corporal	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	4,75	0%	0%	100%
Febrero	4,18	4%	13%	83%
Marzo	3,91	11%	27%	62%
Abril	4,09	3%	24%	72%
Mayo	3,99	12%	14%	74%
Junio	3,93	8%	25%	68%
Julio	3,75	18%	44%	38%
Agosto	3,67	18%	49%	32%
Setiembre	3,54	40%	33%	27%

Oferta forrajera y carga animal




La oferta forrajera de setiembre se ubica en 3,21 KgMS/Kg PV y la carga animal en 0,80 UG/ha.

Detalle mensual de oferta forrajera y carga animal

Mes	Oferta Forrajera (KgMS/Kg PV)	<3	3-<5	≥5	Carga animal UG/ha
Enero	3,79	20%	40%	40%	0,96
Febrero	2,85	58%	32%	11%	0,96
Marzo	4,84	17%	35%	48%	0,90
Abril	6,12	8%	33%	59%	0,89
Mayo	6,06	8%	28%	63%	0,86
Junio	4,01	25%	43%	31%	0,85
Julio	3,60	33%	44%	23%	0,88
Agosto	3,55	38%	45%	16%	0,84
Setiembre	3,21	47%	38%	16%	0,80

Recría e impacto de garrapata




Detalle mensual de recría e impacto de garrapata

Mes	Peso vaquillonas (kg)	Peso terneras (kg)	Impacto garrapata (%)
Enero	293	146	0%
Febrero	248	142	0%
Marzo	236	156	46%
Abril	253	200	42%
Mayo	251	166	45%
Junio	246	206	33%
Julio	256	166	32%
Agosto	242	170	36%
Setiembre	246	216	34%

Indicador	Agosto	Setiembre	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	4,6	4,3	-0,3	-7,0%	cm
Condición corporal	3,9	3,9	-0,1	-1,8%	
Oferta forrajera	3,5	3,2	-0,3	-9,0%	KgMS/Kg PV
Carga animal	0,78	0,80	0,03	3,3%	UG/ha
Peso vaquillonas	289	269	-21	-7,1%	kg
Peso terneras	194	201	6	3,3%	kg
Impacto garrapata	25,0	22,9	-2,1	p.p.	% predios

RE cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,3 cm (-7,0% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,9, oferta forrajera de 3,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,80 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 269 kg y el de terneras 201 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 22,9%.

Disponibilidad de campo natural




En RE, la disponibilidad de campo natural se ubica en 4,28 cm en setiembre. La distribución por rangos permite identificar la proporción de predios en situación más ajustada y el peso de los rangos intermedios.

Detalle mensual de disponibilidad de campo natural

Mes	Altura (cm)	<3 cm	3-<5 cm	5-<9 cm	≥9 cm
Enero	5,47	23%	19%	46%	12%
Febrero	5,04	25%	33%	31%	12%
Marzo	5,58	24%	32%	27%	17%
Abril	6,35	7%	31%	44%	18%
Mayo	6,68	6%	24%	50%	19%
Junio	5,04	25%	29%	34%	11%
Julio	4,90	20%	34%	41%	5%
Agosto	4,61	19%	43%	33%	5%
Setiembre	4,28	29%	34%	35%	2%

RE - Evolución de indicadores

Condición corporal




La condición corporal promedio se ubica en 3,86 en setiembre. El seguimiento por rangos permite dimensionar la proporción de predios con CC menor a 3,5.

Detalle mensual de condición corporal

Mes	Condición corporal	<3,5	3,5-4	≥4
Enero	4,03	23%	23%	55%
Febrero	3,81	16%	39%	45%
Marzo	3,93	11%	44%	45%
Abril	3,94	8%	43%	49%
Mayo	4,07	7%	31%	62%
Junio	4,21	7%	19%	74%
Julio	4,11	6%	27%	68%
Agosto	3,93	13%	33%	55%
Setiembre	3,86	16%	40%	43%

Oferta forrajera y carga animal




La oferta forrajera de setiembre se ubica en 3,18 KgMS/Kg PV y la carga animal en 0,80 UG/ha.

Detalle mensual de oferta forrajera y carga animal

Mes	Oferta Forrajera (KgMS/Kg PV)	<3	3-<5	≥5	Carga animal UG/ha
Enero	3,29	43%	35%	22%	0,94
Febrero	2,83	57%	26%	17%	0,92
Marzo	2,83	53%	16%	31%	0,91
Abril	4,35	24%	33%	43%	0,82
Mayo	4,75	25%	29%	45%	0,81
Junio	3,05	47%	25%	27%	0,81
Julio	3,34	43%	29%	28%	0,78
Agosto	3,50	39%	38%	23%	0,78
Setiembre	3,18	45%	28%	26%	0,80

Recría e impacto de garrapata



Detalle mensual de recría e impacto de garrapata

Mes	Peso vaquillonas (kg)	Peso terneras (kg)	Impacto garrapata (%)
Enero	271	174	0%
Febrero	262	165	25%
Marzo	268	161	21%
Abril	266	175	27%
Mayo	262	167	26%
Junio	269	187	18%
Julio	274	201	16%
Agosto	289	194	25%
Setiembre	269	201	23%

Mensajes clave de acuerdo a la información de setiembre

Región/ Nivel	Setiembre 2026
Nacional	Setiembre confirma una menor altura de campo natural respecto a agosto, con oferta forrajera estable y carga prácticamente sin cambios. La muestra mensual está compuesta por 562 predios, 134.807 ha relevadas, 115.625 vacunos y 70.898 ovinos.
Litoral Norte	Cierra setiembre con altura media de campo natural de 5,4 cm (-4,5% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,8, oferta forrajera de 4,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,81 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 309 kg y el de terneras 193 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 25,8%.
Litoral Centro	Cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,1 cm (-7,9% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,8, oferta forrajera de 3,3 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,89 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 292 kg y el de terneras 232 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 1,4%.
Noreste	Cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,0 cm (-20,4% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,5, oferta forrajera de 3,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,80 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 246 kg y el de terneras 216 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 33,8%.
Este	Cierra setiembre con altura media de campo natural de 4,3 cm (-7,0% vs. agosto), condición corporal promedio de 3,9, oferta forrajera de 3,2 KgMS/Kg PV y carga animal de 0,80 UG/ha. El peso promedio de vaquillonas fue 269 kg y el de terneras 201 kg. El impacto medio y alto de garrapata se ubicó en 22,9%.