

**Décimo noveno informe de situación referido al déficit hídrico – déficit forrajero.**

*El presente informe resume la información recabada por los técnicos del Plan Agropecuario desplegados en el territorio nacional, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual relacionada al déficit hídrico existente. Estamos monitoreando la situación de manera permanente.*

**Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario)****Departamento de Artigas**

Esta semana no hubo registros de lluvia y las temperaturas medias fueron muy superiores a la semana pasada. Los suelos conservan buen nivel de humedad. El aporte de fibra de las pasturas naturales naturalmente va disminuyendo y a medida que esto pasa aparecen productores que empiezan a pensar en el uso de fibra externa (fardos) como suplemento para la falta de la misma en campo natural. Sabido es que hay situaciones prediales que hace más de dos meses que están con este problema, principalmente en la zona este del departamento. Praderas permanentes con buen desarrollo. Verdeos de raigrás con alta respuesta a la aplicación de urea. Se ven vacas de rodeos de cría que empiezan a bajar su condición corporal en predios que empieza a verse aparente falta de forraje. Arroyos, cañadas y tajamares con máxima capacidad de aporte de agua.

**Departamento de Salto**

No han ocurrido precipitaciones de magnitud esta semana. Han ocurrido heladas agrometeorológicas. Pasando la mitad de invierno, se observa que la disponibilidad actual de pasto en los predios es variable entre zonas, siendo aceptable en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto que se mantienen entre 4 a 5 cm. Al Noreste del departamento (seccionales 10, 11 y 12) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (< 3 cm), diferencia que se explica especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. Tanto el consumo animal como la evaporación atmosférica son mínimas en esta época, por lo que se espera que la situación de agua para abrevadero animal se mantenga óptima durante el resto del invierno. El estado general de los ganados es bueno, aunque se observa predios con ganados en clara situación de pérdida de condición corporal, especialmente en la zona Noreste del departamento. En los predios que entraron al invierno con alturas de pasto de 5 cm y más, con dotación ajustada, la altura de pasto ha variado poco, y los ganados han mantenido condición corporal (objetivo del invierno), mientras que en predios que entraron al invierno con baja disponibilidad de pasto (< 3 cm) se observa una clara pérdida de condición corporal y los campos se mantienen pelados, lo que seguramente comprometerá el desempeño en la parición y próximo entore. Se observa a productores realizando con éxito la suplementación estratégica especialmente en categorías de recría.

**Departamento de Paysandú**

La semana se caracterizó por la ocurrencia de temperaturas elevadas para la época, las que en general estuvieron asociadas a una alta humedad relativa del ambiente. No se registraron precipitaciones significativas. Las pasturas naturales siguen mostrando, en general, buenos niveles de disponibilidad de forraje. Como hemos venido informando, se verifica una importante pérdida en la calidad de los tapices. No existen problemas de aguadas a la fecha. El estado de los ganados sigue siendo bueno general. Se continúa con la suplementación, fundamentalmente de categorías de recría (mayoritariamente terneras en su primer invierno). Avanza el estado de gestación de los rodeos. Se espera que en las próximas 2-3 semanas comience la parición (fundamentalmente de vaquillonas) en algunos predios. El estado general de los lanares es bueno en todas sus categorías. La práctica de la suplementación pre-parto y del manejo diferencial según carga fetal, se lleva a cabo en algunos predios del departamento

**Departamento de Río Negro**

No han ocurrido precipitaciones significativas en esta última semana. La temperatura aumentó durante esta semana, asociada a una elevada humedad relativa en el ambiente. Tanto las cañadas como tajamares, se encuentran en un estado normal, sin presentar ningún tipo de problemas. La cantidad de pasturas,

tanto naturales como sembradas se encuentran con muy buena disponibilidad de forraje. Algunos rodeos ya están por comenzar los primeros partos, más que nada de vaquillonas. En la gran mayoría de los casos, los ganados se ven en muy buen estado. En muchos predios se está realizando suplementación proteica de invierno debido a la falta de calidad de las pasturas.

#### **Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario)**

##### **Departamento de Tacuarembó**

Se registró un crecimiento de las temperaturas, superando los 20°C con ausencia de precipitaciones. No se muestran cambios significativos en la comparación con el último informe. Con menores tasas de crecimiento de forraje de campo natural sincrónicamente con reducción de forraje en los sistemas ganaderos, se observa habitualmente pérdida de condición corporal de bovinos de carne y más aún en los sistemas ganaderos más afectados por el déficit hídrico. Bajo tales peculiaridades, los verdeos de invierno, el uso de concentrados, pastoreo en caminos vecinales y/o combinaciones diversas, han sido las estrategias puestas en práctica por los ganaderos con énfasis en los que efectuaron ajustes de carga desfasados temporalmente durante la mayor intensidad del déficit hídrico.

##### **Departamento de Rivera**

El estado del tiempo se presentó templado y sin precipitaciones, con temperaturas altas para la época. Las pasturas naturales en general tienen baja oferta, y en los casos donde la disponibilidad es mayor se presenta una baja relación verde/seco, indicando una baja calidad de la misma. Las pasturas implantadas (praderas, verdeos y mejoramientos) en general presentan muy buena condición y excelente piso, pero como se ha mencionado en informes anteriores este tipo de pasturas incluyen una baja proporción del uso del suelo. El ganado en muchos sistemas ha perdido condición corporal y los productores con frecuencia recurren a diversos tipos de suplementación (minerales, sales proteinadas, concentrados o fardos).

##### **Departamento de Cerro Largo**

En la presente semana, se registró un aumento en la temperatura, superando los 20°C. No se presentan cambios significativos con los informes anteriores. A medida que transcurre el invierno disminuye el forraje disponible en volumen y calidad, y los animales pierden condición corporal. Los verdeos de invierno, el suministro de fardos y raciones son las principales medidas que han tomado los productores en los sistemas más comprometidos.

#### **Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario)**

##### **Departamento de Lavalleja**

Durante el periodo se registraron algunas lluvias- lloviznas en el departamento que oscilaron los 5 a 20 mm y el tiempo se presentó con temperaturas altas para la época entorno a los 20°C, lo cual hizo más confortable la sensación térmica, mitigó los intensos fríos de la semana anterior disminuyendo el gasto energético de los animales. Estas temperaturas, las lluvias y humedad existente benefició el crecimiento de verdeos y reverdeció el tapiz en algún bajo principalmente del campo natural. La crisis forrajera del campo natural en general es muy importante y se ven ganados en general sentidos. Muchos productores están suplementando con raciones, afrechillos, fardos, aunque la oferta de estos últimos es muy escasa. Los verdeos en general que fueron sembrados temprano están dando buenos aportes y los sembrados tardíos están recién comenzados a dar sus primeros pastoreos. Las recrias e invernadas sobre verdeos en general vienen con ganancias de aceptables a buenas. Están comenzando las pariciones de vaquillonas que fueron entoradas temprano y continúan las pariciones de la majada.

##### **Departamento de Maldonado**

En lo que refiere a esta semana se registraron algunas lluvias sobre el fin de semana y nuevamente en los días martes y miércoles. Se dieron altas temperaturas, atípicas para la estación, cortando la serie de heladas que se venían dando la semana anterior. Las temperaturas fueron muy buenas y oportunas ya que se nota inmediatamente los reverdecimientos y rebrotes de los campos, ayudando también las lluvias que se concretaron. Esto no cambia la situación forrajera, ya que sigue siendo complicada, con muy bajas disponibilidades de pasto a nivel general. Los ganados están en peor estado que el año pasado a la misma fecha, la categoría más comprometida es la vaca que apenas logró preñarse y que entró con baja condición

corporal al invierno. También hay que destacar que ha habido un gran movimiento por parte de los productores por la compra de suplementos como raciones y afrechillos y lo mismo para el caso de los fardos. Continúan las pariciones de las majadas que fueron encarneradas temprano.

#### **Departamento de Treinta y Tres 3<sup>a</sup> y 16<sup>a</sup> secc.policial de Cerro Largo**

La semana estuvo caracterizada por días sin precipitaciones y con temperaturas altas para la época. En lo que respecta a lo forrajero, si bien a nivel general y con respecto al campo natural no se pueden observar cambios significativos, en lo que refiere a mejoramientos, praderas y verdeos se observaron crecimientos importantes (para lo normal de la época) debido a la conjunción de buena humedad a nivel de suelo y altas temperaturas durante varios días consecutivos. En síntesis, el nivel forrajero a nivel de la zona continúa complicado y son pocos los productores que ven alguna mejora significativa. En cuanto al estado de los ganados sigue en las mismas condiciones de informes anteriores. Ganados muy sentidos y sin expectativa de mejora en el futuro cercano. Durante estos días de veranillo los animales tienen un mejor pasar debido a que bajan los requerimientos de energía. En lo que respecta a las majadas se encuentran en buen estado, se siguen sumando majadas que empiezan a parir. Sigue avanzando la esquila preparto.

#### **Departamento de Rocha**

Durante la semana se dieron precipitaciones en general de baja magnitud y días con temperaturas cálidas elevadas para la época. Del punto de vista forrajero, estas condiciones fueron favorables para un reverdecimiento de los campos naturales, pero sin mayor impacto a nivel de producción. En el crecimiento de verdeos y praderas es donde se vio el mayor impacto de las condiciones de buena humedad y altas temperaturas. A nivel global la situación sigue incambiada con muy baja disponibilidad de forraje en los campos. Del punto de vista de los ganados el estado continúa siendo bajo, aunque las condiciones de temperaturas más cálidas contribuyeron en atenuar las pérdidas de estado que se vienen dando producto de la baja disponibilidad de forraje y requerimientos que van en aumento en especial en vacas que ya entraron en su último tercio de gestación, algunas ya próximas a parir. La suplementación está jugando un rol importante en esas categorías. En cuanto a las majadas están transcurriendo las pariciones de las majadas encarneradas más tempranas.

#### **Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro)**

Durante esta última semana, se comenzó con días con altas temperaturas y sol, para finalizar con tres días de alta nubosidad y precipitaciones, fundamentalmente en el sur del territorio. Las altas temperaturas para la época no impactaron sobre el campo natural ni tampoco sobre mejoramientos de campo. En cambio en los verdeos de invierno provocó respuestas en crecimiento. También permitió aplicaciones de urea a muchos verdeos. El rodeo en general, como habíamos planteado en informes anteriores, con una condición corporal muy justa para transcurrir el invierno. Días de temporal, repercuten directamente en la performance animal, por lo que es necesario tomar medidas estratégicas rápidamente. En los predios invernadores, gracias al repunte de los precios del novillo gordo, se intensifica el uso de la suplementación para acelerar la salida de los animales. Con este clima y entendiendo que todavía faltan más de 30 días para finalizar el invierno, podemos concluir que para muchos productores la situación del rodeo de cría va a ser crítico.