

Décimo informe de situación referido al déficit hídrico – déficit forrajero.

El presente informe resume la información recabada por los técnicos del Plan Agropecuario desplegados en el territorio nacional, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual relacionada al déficit hídrico existente. Estamos monitoreando la situación de manera permanente.

Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario)

Departamento de Artigas

En la presente semana se registraron precipitaciones en el departamento de Artigas que rondaron los 10 mm haciendo que la humedad que existía en el suelo se mantenga. Sigue siendo la zona norte del departamento la que más beneficiada estuvo en relación al volumen de precipitaciones. Existen predios con déficit importante de forraje sobre todo en las seccionales policiales **10^a y 11^a**, aunque en el resto del departamento empiezan a descubrirse casos nuevos. La preocupación y comentarios de los productores no son alentadores viendo que aún no empezó el invierno y hay predios que ya no tienen casi forraje de campo natural para ofrecer. Las consultas por temas de suplementación son frecuentes y hay datos de productores que ya están comprando fardos de arroz en varios puntos del departamento. Los raigrases empezaron a responder luego de las lluvias ocurridas la semana anterior y se ven lugares o chacras donde no aparecían que ya están brotando. Se detectaron siembras de raigas en marzo que no han tenido buenas implantaciones. La condición corporal de las vacas de cría debería ser de 5 para pasar el invierno cumpliendo los objetivos de la cría, cosa que no es la realidad en varios predios y si le sumamos a esto la falta de pasto tenemos un problema futuro viendo el próximo entore. Con las últimas precipitaciones el nivel de agua en los cursos de agua ha mejorado.

Departamento de Salto

En esta semana no ocurrieron precipitaciones. Se registraron las primeras heladas agrometeorológicas. Las pasturas naturales se encuentran en crecimiento y con color verde a partir de las lluvias ocurridas a principios de mes. La disponibilidad de pasto ha ido decreciendo desde el mes de abril debido al déficit hídrico ocurrido y actualmente se mantiene. En la zona Este del departamento, seccionales policiales **10^a, 11^a y 12^a**, con mayoría de suelos superficiales, se observa a los campos en general con menor disponibilidad a la óptima y se esperan situaciones de déficit de forraje durante el invierno. En predios donde se mantuvo la carga ajustada y se planifican nuevos ajustes estratégicos para entrar al invierno la disponibilidad de pasto permitirá el transcurso del invierno sin grandes problemas. Aguadas naturales y artificiales se han recuperado en zonas centro y Oeste, persiste la problemática en la zona Este. El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observan predios con ganados en peor condición. Los porcentajes de preñez son buenos en general. Se están culminando normalmente los destetes de terneros nacidos en primavera, observándose buenos pesos. La organización de productores de la zona Este comenzó con el pedido de concentrado para suplementación invernal. Se están dando problemas sanitarios con garrapata.

Departamento de Paysandú

Semana sin lluvias de relevancia agronómica. Se registró un episodio de helada agrometeorológica en algunas zonas del departamento, el día lunes 11, pero sin mayores consecuencias sobre la calidad de las pasturas. Como se ha venido informando, en general los tapices naturales muestran aceptables disponibilidades de forraje. No se registra en ninguna zona (pudiera haber excepciones a nivel predial), situaciones de crisis forrajera. Se pastorean praderas y verdeos que en general están haciendo muy buenos aportes de forraje. Como se informó anteriormente, las lluvias de fines de abril, mejoraron en parte la compleja situación general de las aguadas, pero siguen existiendo problemas en varias zonas del departamento. El estado general de los ganados es bueno para la época. En síntesis, ganados en general sin problemas en todas las categorías, aguadas continúan con dificultades en su capacidad de aporte para abrevadero de los animales.

Departamento de Río Negro

No se han registrado lluvias esta última semana. En estos últimos días la temperatura ha descendido notoriamente, principalmente en la noche, pero aun así no se han registrado heladas. La situación de la disponibilidad de agua de abrevadero para los animales se ha solucionado debido a las abundantes lluvias ocurridas a fin de mes de abril. De igual manera, es un tema para seguir de cerca. Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje es de aceptable a buena en la mayoría de los casos. Las pasturas naturales siguen presentando buenos niveles de disponibilidad para la época, excepto en aquellos casos donde manejan cargas altas. El caso de las pasturas sembradas, las cuales hasta mediados de abril se veían un poco retrasadas en su crecimiento, respondieron muy bien a las últimas lluvias. En la gran mayoría de los casos ya han culminado los destetes, con muy buenos pesos. La condición corporal de los rodeos es muy buena. Las categorías de invernada se ven con un estado muy lindo. Datos de diagnósticos de gestación, siguen mostrando muy buenos niveles de preñez en los rodeos (preñeces de 75% a 95%). Aún faltan rodeos por realizar diagnóstico.

Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario)

Departamento de Tacuarembó

Se reportaron precipitaciones entre 0 y 10 mm para el departamento de Tacuarembó, entre los días 7 al 13 de mayo inclusive. Las condiciones de temperatura reinantes entre 15° y 20° centígrados, luminosidad y humedad disponible en los suelos, condiciones muy adecuadas para mejorar el proceso de implantación y tasa de crecimiento de verdeos de invierno. Aunque las tasas de crecimiento del campo natural sean históricamente altas en mayo, serán insuficientes para acumular forraje para el invierno, **con énfasis en la 8ª y 15ª seccional policial** respectivamente. Continúan las dificultades con respecto al agua de abrevadero para consumo animal. En igual sentido, pero muy dispar, tal dificultad persiste para las seccionales policiales **7ª y la 9ª**.

Departamento de Rivera

Las muy escasas precipitaciones del período 7 al 14 de mayo, no han permitido levantar las restricciones del agua de abrevadero de los animales, que en algunos lugares se extienden también al consumo humano. Los verdeos y praderas implantadas, están respondiendo muy bien, aunque representan una muy baja proporción del Departamento. El campo natural, presenta una buena calidad aparente en general, pero muy baja disponibilidad en casi todas las seccionales, agravándose en aquellas donde el déficit hídrico ha sido más largo y profundo (**7a, 8a, 6a, 4a y 5a**).

Departamento de Cerro Largo

Desde principios de marzo, continúa la problemática de aguadas artificiales en algunas seccionales del departamento, principalmente en la **8va, 7ma, 6ta, 5ta, 4ta y 14ª**. En cuanto a la disponibilidad de forraje y condición del ganado, las seccionales más problemáticas son aquellas que recibieron menos acumulados en todo este período, la 4ta, la 5ta y parte de la 14, donde en muchos sistemas, la situación es crítica (menos de 3cm de pasto y condición corporal inferior a 4). También se observa en todas las seccionales del departamento, muchos sistemas comprometidos, con baja disponibilidad forrajera (menos de 3cm), esto responde a la falta de medidas tomadas a tiempo, principalmente, la carga no ajustada adecuadamente en el otoño. Las lluvias que han ido ocurriendo en este período de tiempo, ha permitido sembrar e implantarse adecuadamente los verdeos de invierno. Excepto para las seccionales 4ta, 5ta y la 14ª, donde se registraron menos precipitaciones que en el resto de las seccionales a lo largo de todo el período, los verdeos recién se están sembrando. En síntesis, **las seccionales más comprometidas desde el punto de vista del estado del ganado, aguadas y disponibilidad forrajera, son la 4ta, 5ta y 14ª**, donde en muchos sistemas se está suplementando el rodeo en general. A esta situación actual, la acompaña un diagnóstico de preñez crítico, en muchos casos de 50%, según datos aportados por profesionales veterinarios y productores ganaderos de la zona.

Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario)

Departamento de Lavalleja

Consultados referentes del departamento podemos afirmar que la situación en el departamento sigue en similares condiciones a lo descrito en informes anteriores. Siendo las principales problemáticas

disponibilidad de forraje y agua de abrevadero para los animales. A medida que pasa el tiempo la situación forrajera empeora, los estados de los animales van desmejorando, principalmente las vacas paridas en primavera y aún no destetadas. En este periodo no se registraron precipitaciones, y la temperatura disminuyó en forma importante durante la noche, con algunas mañanas con pequeñas heladas, con días cálidos y soleados. Se continúa con la siembra de verdeos de invierno y los sembrados temprano ya están dando los primeros pastoreos y muchos productores están suplementando diferentes categorías. Se continúan haciendo los diagnósticos de gestación con resultados diversos pero en general en predios que vienen con manejos de años anteriores, como consecuencia del déficit hídrico los resultados de preñez se han afectado en forma importante, habiendo por supuesto excepciones con altos % de preñez.

Departamento de Maldonado

En los últimos días no se han registrado lluvias, al menos de grandes volúmenes. La temperatura durante el día es agradable pero durante la noche y madrugada baja considerablemente. Reafirmando lo anterior hace que el campo en general responda muy poco, ya agravando más la situación ya que hay falta de forraje. En algunos predios los potreros que pueden llegar a tener algo de pasto, no tienen agua o muy poca cantidad disponible como para el ganado. Se siguen realizando diagnósticos de gestación. Proporcionando resultados poco alentadores de cara a la próxima parición a nivel general en todo el departamento. En informes anteriores se aclaraba que el norte del departamento estaba en mejor situación forrajera, pero los resultados de diagnósticos han sido bajos también para esas seccionales. Como resumen hay que destacar que las precipitaciones han sido insuficientes ya que en la mayoría de los casos no se han producido grandes recargas a las aguadas y también sigue faltando agua para el campo.

Departamento de Treinta y Tres y 16^a secc. policial de Cerro Largo

Durante la última semana prácticamente no se registraron precipitaciones, salvo alguna pequeña excepción. La otra característica fue la baja de temperaturas con inicio de alguna helada leve. Esta combinación hace que la respuesta en crecimiento de pasturas sea muy baja. Recordamos que el informe se realiza en base a información de productores y otros referentes. En cuanto a lo forrajero entendemos que la situación en la mayoría de los predios no tiene cambios positivos, salvo los que han podido entrar a pastorear algún verdeo o están cerca del ingreso, esta situación se da en pocos predios. Lo más recurrente es que los predios están con poco y muy poco pasto, sin mucha perspectiva de mejora y tratando de solucionar por otras vías, baja de carga, suplementación. El agua para abrevadero, para muchos sigue siendo la principal limitante. Las vertientes han comenzado a manar y la poca agua que hay rinde un poco más. También los animales concurren menos a las aguadas y eso mejora la calidad de la misma. Enseguida de la lluvia importante de hace 10 días hubo una pequeña mejora en la calidad de las aguadas, pero ese efecto ya desapareció. En cuanto al estado de los ganados la situación sigue incambiada. Los que tienen algo de pasturas implantadas y/o comenzaron a suplementar sobrellevan la situación. Pero los que basan su producción en campo natural, aun habiendo bajado carga; la situación del ganado es compleja. En muchos lugares sigue la baja continua en condición corporal y los ganados están muy feos. Continúa la búsqueda de soluciones por parte de los productores, siguen bajando carga, aún de categorías que hasta hace unos días no pensaban vender y han comenzado a suplementar categorías que no pensaban hacerlo. Las seccionales más complicadas son las que entraron en la emergencia (2^a, 7^a y 10^a) y parte de la 3^a, 4^a, 5^a y 9^a de Treinta y Tres; y la 3^a y 16^a de Cerro Largo. Arrastran el efecto del período extenso sin lluvias.

Departamento de Rocha

La situación sigue siendo complicada en varias zonas del departamento que son aquellas que arrastran períodos más prolongados con falta de precipitaciones y abarcan principalmente la faja costera y la zona norte del departamento. En la última semana no se han registrado precipitaciones de magnitud, por su parte las temperaturas durante la noche han bajado considerablemente. Se continúan manifestando condiciones de días secos que amanecen con poco rocío de corta duración con aumento de temperatura hacia el mediodía y vientos fuertes y temperaturas bajas hacia la tarde y la noche. En cuanto a la situación de pasturas en lo que refiere al recurso campo natural las condiciones siguen siendo desfavorables para su crecimiento y merma su disponibilidad día a día. Por el lado de los verdeos es donde ha habido una mejor respuesta en especial de raigras y aquellos sembrados temprano son los que están dando algún pastoreo. En cuanto al estado del ganado la situación continúa desmejorando en especial en la categoría

vacas de cría en situaciones en las que aún permanecen con ternero al pie. La situación de las aguadas sigue siendo limitante para la producción como para el manejo de la pastura y de los animales, aunque en este último aspecto la demanda ha mermado producto de los ajustes de dotación y la menor demanda producto de las condiciones ambientales. En lo que refiere a las medidas de manejo, se continúan realizando ajustes de dotación, destetes, se sigue con las siembras de raigras aún bajo condiciones secas, suplementación y pastoreo en las calles.

Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro)

El otoño se ha caracterizado por días fríos y en la medida que ha avanzado las temperaturas han bajado. Sin presencia de heladas, y en durante este periodo no ocurrieron episodios de lluvia. La disponibilidad de agua a partir de arroyos, cañadas y tajamares, es limitada, donde las lluvias no permitieron recuperar los niveles normales. En Durazno permitió en la mayor parte del departamento recuperar las aguadas. A pesar que durante este periodo no es alto el consumo, la situación de aguadas preocupa.

Campo Natural: el crecimiento durante este periodo es bajo a nulo, donde se aprecia en forma generalizada en todo el territorio una disponibilidad baja de forraje, lo que limita el forraje en pie para este periodo y el invierno. **Campo Natural Mejorado:** la situación del verano, donde los campos se han sobre pastoreado y por lo tanto la altura del campo natural es baja, permitió el reclutamiento de las leguminosas de los campos mejorados y facilita la germinación en los casos en que se agregó alguna leguminosa. **Praderas:** la siembra de praderas se desarrollado a buen ritmo, aún resta un área de siembra de pradera, las que se hacen luego de la cosecha de soja. Las praderas de 2 y más años, han respondido acorde a la estación. Siguen habiendo presencias altas de población de trips y pulgilla, en praderas recién sembradas están provocando gran preocupación a los productores y en algunas situaciones se han perdido muchas plantas, y obligó a resembrar. **Verdeos invierno:** este año el crecimiento de los verdeos no ha sido como otros años, explicado por falta humedad óptima del suelo, ataque de insectos (lagarta y grillo) y falta de luminosidad. Las avenas sembradas temprano (febrero), ya realizaron el primer pastoreo. Para el caso de los raigrases sembrados en marzo ya están realizando el primer pastoreo con volúmenes interesantes de forraje. Y en muchos casos sin la necesidad de agregado de urea por el alto contenido de nitrógeno en suelo como consecuencia de la seca.

VACUNOS

Cría: Se vienen han realizado las ecografías, en el rodeo de cría. A pesar de las condiciones climáticas la condición corporal de las vacas de cría es buena; no así los resultados de los diagnósticos de gestación, los cuales son muy variables entre productores. En promedio se está 10 puntos por debajo de los resultados del año pasado. **Recría:** El estado de las recrias es bueno. En comparación con años anteriores los pesos de destete son menores. La mayor parte de los destetes y venta de terneros ya se concretaron. **Sanidad:** No han ocurrido episodios de relevancia. Las condiciones climáticas y el marcado déficit hídrico anterior, han provocado que verdeos de invierno reúnan las condiciones para la acumulación excesiva de nitratos. Se supo de algún episodio puntual de intoxicación en vacunos por nitratos y nitritos.

OVINOS

El estado corporal y sanitario de las majadas en líneas generales es bueno. La encarnerada ha finalizado, algunos productores se abocan a las tareas de diagnóstico de gestación mediante ecografía.

RESERVAS FORRAJERAS:

Hemos detallado en los informes anteriores, la preocupación por la falta de ese forraje que será necesario para los próximos meses, donde hay predios que se han consumido entre el 40 al 50% de esa reserva. Son muy poco los productores que cubrieron esa faltante, por medio de compra.

COMENTARIOS GENERALES:

La situación generalizada en la región, es la preocupación para los meses venideros, explicado por la baja disponibilidad de forraje en pío (Campo Natural y pasturas sembradas), Condición Corporal de rodeo, poca agua para abrevadero y falta de reserva forrajeras, lo que estará limitando la performance animal y por lo tanto el resultado de las empresas. Estamos transcurriendo un otoño con muchas horas nubladas, humedad y temperaturas frías por la noche, esto repercute directamente en el crecimiento de todas las pasturas. En este corto periodo de tiempo desde el último informe (7 días), no hay cambios importantes en los predios ganaderos de la Regional.