Montevideo, 2 de julio de 2020

Décimo séptimo informe de situación referido al déficit hídrico – déficit forrajero.

El presente informe resume la información recabada por los técnicos del Plan Agropecuario desplegados en el territorio nacional, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual relacionada al déficit hídrico existente. Estamos monitoreando la situación de manera permanente.

Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario)

Departamento de Artigas

La presente semana se caracterizó por presentar días muy fríos y garúas. La situación de la disponibilidad de forraje de campo natural sigue incambiada, con diferencias entre predios. No se puede hablar de situaciones de déficit forrajero generalizado. Sin dudas que los días fríos y nublados frenan la buena acumulación de MS principalmente en verdeos de raigrás aunque estos presentan buena disponibilidad principalmente los que fueron fertilizados con N. Productores de varias zonas utilizan la suplementación invernal como estrategia de mantenimiento de peso en recrías que están en distintas situaciones de disponibilidad de pasto. Fardos, suplementación energética y proteica según el caso. Arroyos, cañadas y tajamares con máxima capacidad de aporte de agua.

Departamento de Salto

Han ocurrido precipitaciones de baja magnitud esta semana y han ocurrido heladas agrometeorológicas normales para la época. Entramos en el invierno, la estación de menor producción de pasto del campo natural (5-6 kgMS/ha/día). La disponibilidad actual de pasto en los predios es variable entre zonas, siendo buena en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto aceptable para entrar al invierno (5 cm), mientras que al Noreste del departamento (seccionales 10, 11 y 12) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (2 – 3 cm). Las precipitaciones ocurridas han colmado la capacidad de las aguadas. Tanto el consumo animal como la evaporación atmosférica son mínimas en esta época, por lo que se espera que la situación de agua para abrevadero animal se mantenga óptima durante el resto del invierno. El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observa predios con ganados en clara situación de pérdida de condición corporal. En situaciones de menor disponibilidad de pasto (< 3 cm) se observa una clara pérdida de condición corporal lo que seguramente comprometerá el desempeño en la cercana parición y próximo entore. Se propone realizar el ajuste de carga, y evaluar la suplementación estratégica, especialmente en zonas de baja disponibilidad de pasto, y especialmente en categorías de recría.

Departamento de Paysandú

Durante la semana comprendida entre el jueves 25 de junio y el jueves 2 de julio, ocurrieron precipitaciones del orden de los 15-20 mm en gran parte del departamento. La temperatura descendió de forma muy importante, registrándose algunas heladas agrometeorológicas. Como hemos venido informando, en términos generales no existen en el departamento situaciones de crisis forrajera a nivel predial. Si bien en las últimas 2-3 semanas, se ha comenzado a notar el transcurso del invierno, los tapices naturales presentan una disponibilidad de forraje buena para la época. Se puede afirmar que el tema aguadas ha quedado resuelto y a la fecha no representa un problema para los productores ganaderos. El estado general de los ganados sigue siendo bueno al inicio del invierno. Las categorías de recría, en algunas situaciones de pérdida importante en la calidad de la pastura, muestran algún grado de dificultad en su desempeño productivo. La suplementación de esta categoría, es una herramienta bastante utilizada en el presente invierno. Se continúan realizando ecografías de diagnóstico de gestación y carga fetal en la majada. Se planifica para las próximas semanas el comienzo de las esquilas preparto. El estado general de los lanares es bueno en todas sus categorías.

Departamento de Río Negro

En la última semana se registraron lluvias de 20 mm en la 9ª secc. policial, 12 mm en la 10ª secc. policial (este), 17 mm en la 7ª secc. policial (Paso de la Cruz), 10 mm 5ª secc. policial (oeste), y 14 mm en Young. El agua de abrevadero para animales sería un tema ya casi superado en la mayoría de los predios. Como se viene comentando en informes anteriores, la cantidad de pasto en campo natural para la época es

aceptable, principalmente en aquellos casos donde manejan cargas ajustadas, pero la calidad de las mismas ha disminuido como consecuencia de la época en la que estamos. En el caso de las pasturas sembradas, los aportes que están dando son muy buenos. Las vacas de cría están llegando al último tercio de gestación en general, viéndose estos con muy buena condición corporal. Las categorías de invernada se ven con un estado muy bueno. En muchos predios se está realizando suplementación proteica de invierno debido a la pérdida de calidad de las pasturas mencionada anteriormente.

Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario)

Departamento de Tacuarembó

A partir de las precipitaciones almacenadas durante el mes de junio se constata en primer lugar, la ausencia de déficit hídrico en las diferentes seccionales policiales en el departamento, y la no existencia de dificultades relacionadas con las aguadas en los sistemas ganaderos. Sin embargo, las consecuencias más severas del déficit hídrico se observa en las seccionales policiales 8ª y 15ª, con altura de forraje de campo natural menor de 3 cm de pasto con variaciones negativas (pérdidas de peso vivo) en la condición corporal de bovinos de carne. Tales particularidades se acentúan aún más, en aquellos sistemas ganaderos que realizaron ajustes diversos desfasados temporalmente durante la intensidad del déficit hídrico ocurridos durante los meses de verano y parte el otoño respectivamente.

Departamento de Rivera

En el período 24 de junio al 1 de julio, el tiempo se presentó con temperaturas muy bajas, características de la estación, incluyendo temporales de lluvia y viento. Los verdeos de invierno en general presentan muy buena condición, entregando mucho forraje, pero su aporte relativo a los sistemas ganaderos en general es bajo, debido a que implican una pequeña proporción del uso del suelo a nivel departamental. El campo natural presenta baja disponibilidad para la mayoría de las zonas que fueron más afectadas por el déficit hídrico de meses anteriores. El estado corporal de los ganados manifiesta pérdidas de estado corporal en muchos rodeos, por lo que algunos productores están utilizando suplementos alimenticios diversos.

Departamento de Cerro Largo

Con las lluvias acumuladas en todo junio (más de 100mm), ya no se registran problemáticas en las aguadas. Por lo tanto, ya no hablamos de déficit hídrico en el departamento, sino de sus secuelas, en aquellos sistemas que ingresaron al invierno con escaso forraje disponible (menos de 3cm). Estos sistemas se ven más generalizados en parte de las seccionales del eje de ruta 7, donde los suelos son más superficiales **(6ta, 7ma, 8va, 9na), y en la 4ta, 5ta, 11ra y 14ta.**

Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario)

Departamento de Lavalleja

Durante este periodo se registración intensas precipitaciones en el departamento con registros acumulados en 7 días de 200 a 280 mm, lo que provoco salientes de ríos y arroyos con anegamientos de campos y corte de rutas y caminos. Dado el volumen e intensidad de las precipitaciones las agudas se recargaron rápidamente. Por otro lado si bien fueron propicias las lluvias para las aguadas, el gran volumen está afectando el pastoreo de verdeos y pasturas implantadas. También se ha generado mucho barro y ablandamiento del piso, por lo cual está complicando o haciendo más dificultosa la suplementación. Respecto al estado de los ganados el mismo en general ha venido desmejorando y más aún estos días de temporal con temperaturas muy bajas, viento, lluvias y lloviznas. Muchas majadas están pariendo o muy próximas a parir y muchas con esquila preparto.

Departamento de Maldonado

En lo que refiere al tiempo de esta semana se caracterizó por el acontecimiento de un temporal, que inició en la madrugada del lunes con vientos fuertes, acompañado de lluvias y bajas temperaturas, manteniéndose esas condiciones hasta la mitad de la corriente semana, registrándose en algunos lugares volúmenes de lluvias entre 70 y 90 mm aprox. Las lluvias que se produjeron en la semana anterior fueron muy oportunas haciendo referencia a los verdeos, praderas y mejoramientos, ya que se observó una muy buena respuesta al aumento de humedad, dejando en evidencia la falta de precipitaciones que había anteriormente. En cuanto al campo natural se produjo un cambio de color a nivel general pero no así en

altura. Según cuentan los productores este temporal hizo que los ganados se resintieran ya que se dieron condiciones con mucho viento, agua y frío, empeorando y acelerando la pérdida de estado de los ganados que ya se venía percatando semana tras semana. En cuanto a las majadas en algunos predios ya se empezaron a producir las primeras pariciones y en los predios que las majadas paren un poco más tarde se están programando las esquilas preparto.

Departamento de Treinta y Tres 3 ª y 16 ª secc.policial de Cerro Largo

En la última semana siguieron ocurriendo precipitaciones, aunque de menor magnitud que la semana anterior. Las temperaturas si bien descendieron, no han castigado de forma considerable al ganado, hubo días fríos y ventosos pero los períodos no fueron de mucha duración ni intensidad. En lo que respecta a lo forrajero, entendemos que sigue sin grandes variantes ya que a nivel de campo natural estamos en el momento de menor crecimiento del mismo. A nivel de mejoramientos de campo, verdeos y praderas se continúa viendo efecto del agua en las mismas. El efecto a nivel predial es variable ya que el porcentaje de mejoramientos en los establecimientos en la zona es bajo y muchos productores carecen de los mismos. En síntesis, el nivel forrajero a nivel de la zona continúa complicado y son pocos los productores que ven alguna mejora significativa. El agua para abrevadero ya no es un problema en la mayoría de los establecimientos ganaderos y las reservas se han completado o han tenido una recarga de significancia.
En cuanto al estado de los ganados sigue siendo preocupante, se observa mucho ganado sentido, también en informes de feria y pantalla se observan ganados en similar estado. En los predios más complicados se empieza a ver de manera frecuente ganado comenzando a bajar paperas y con estado general muy bajo.

Departamento de Rocha

La semana estuvo marcada por la ocurrencia de un fuerte temporal de viento y lluvia acompañado de temperaturas frías. A nivel de pasturas sigue la preocupación por la escasez de forraje con la que se entró al invierno. Los crecimientos de pasto a nivel de campo natural son muy lentos. Por su parte hay una buena respuesta en los mejoramientos de campo, praderas y una muy buena respuesta en los verdeos, aunque con el temporal algunos prontos para pastoreo no se han podido utilizar por falta de piso. A nivel de las aguadas la recarga es total o está muy próxima de serla en la mayoría de las situaciones. El estado del ganado continúa siendo dispar, en general el ganado que quedó en los campos luego de los ajustes de dotación fue el que estaba en mejor estado pero ha venido desmejorando y esta semana se acentuó esa perdida por efecto del temporal. La suplementación continúa siendo una herramienta bastante utilizada para atenuar las pérdidas.

Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro)

Durante esta semana, todo el territorio que comprende la regional vienen registrando precipitaciones constantes, sumado en los últimos días a bajas temperaturas y viento sur, lo que ha provocado sensaciones térmicas muy baja. Luego de estas precipitaciones abundantes, se han recuperado las reservas de agua naturales y los cauces que estaban fuera de cota retomaron su nivel normal. El campo natural y los mejoramientos de campo, les es favorable la humedad del suelo, con la consideración que las temperaturas descendieron y las tasas de crecimiento se enlentecen, en muchos predios se están ofreciendo fardos para complementar la falta de forraje. Para las pasturas sembradas, estas lluvias han venido muy bien, porque en zonas puntuales faltaba humead en el suelo para verdeos y praderas fundamentalmente con presencia de festuca y trébol blanco. Respecto al manejo, el exceso de humedad causa algunas dificultades de manejo por falta de piso y animales mojados. Ha limitado el pastoreo normal, se intenta cuidar las praderas haciendo pastoreos horarios en las zonas donde hay piso, restringiendo la entrada para no generar destrozos en las praderas y verdeos. Respecto a los cultivos agrícolas, resta sembrar alguna área menor de cultivos de invierno que no ha podido sembrarse por las condiciones del suelo. Estas bajas temperaturas son muy favorables para los cereales. El ganado se ha mantenido, si bien ya pasamos el día más corto, se aproximan días críticos para los animales, las bajas temperaturas, los vientos actuales comienzan a demostrar que el invierno está instalado.