

Montevideo, 4 de junio de 2020

Décimo tercer informe de situación referido al déficit hídrico – déficit forrajero.

El presente informe resume la información recabada por los técnicos del Plan Agropecuario desplegados en el territorio nacional, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual relacionada al déficit hídrico existente. Estamos monitoreando la situación de manera permanente.

Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario)

Departamento de Artigas

En lo que va de la semana aún no se registraron lluvias, las mismas están previstas para el día viernes 5. Si hubo temperaturas cercanas a 0°C un par de noches que generaron la formación de heladas importantes. La disponibilidad del campo natural en general va disminuyendo y con el comienzo de los fríos intensos es más notorio el descenso. Se empezaron a utilizar algunos verdeos de raigrás que presentaron buenas tasas de crecimiento. Aparentemente hay buena respuesta a la aplicación de urea por la humedad presente en los suelos. Se siguen practicando los destetes con pesos de terneros satisfactorios, de 150 kg y más en general. La capacidad de aporte de agua de los cursos naturales se encuentra en un buen nivel.

Departamento de Salto

No ocurrieron lluvias esta semana. En Mayo pasado se acumularon lluvias en torno a los 100 mm en todo el Departamento. La temperatura se ha mantenido cálida durante el día, con ocurrencia de las primeras heladas agrometeorológicas de magnitud general. Debido a las lluvias ocurridas las pasturas naturales se ven activas y de buen color verde. Entramos en el mes de menor crecimiento del campo natural (5-6 kgMS/ha/día) debido especialmente por las pocas horas de sol y temperaturas bajas. La altura de pasto es variable entre zonas, siendo buena en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto aceptable para entrar al invierno (5 cm), mientras que al Este (seccionales 10 a, 11 a y 12 a) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (2 – 3 cm), diferencia que se explica especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. Aguadas naturales y artificiales se han recuperado a partir de lluvias caídas en todo el departamento. El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observa predios con ganados en peor condición. Se propone realizar el ajuste de carga, y evaluar la suplementación estratégica, especialmente en zonas de baja disponibilidad de pasto, y especialmente en categorías de recria.

Departamento de Paysandú

No se registraron lluvias. Se verificó la ocurrencia de algunas heladas agrometeorológicas durante la semana. Campo natural con buena disponibilidad en los tapices naturales en general. En suelos arenosos se puede observar en algunos potreros, situaciones de muy altas acumulaciones de forraje. Se acentúa con el paso de los días, la pérdida en la calidad de las pasturas nativas. Aguadas, la situación se mantiene incambiada respecto a informes anteriores. En algunas zonas, persisten problemas de disponibilidad de agua a escala de potreros. El estado general de los ganados sigue siendo bueno en general en todas las categorías. Ganados con parición de otoño (porcentaje muy menor del rodeo del departamento) también presentan un correcto estado corporal para la época. Se está comenzando la suplementación de categorías jóvenes (terneros y en algún caso animales de sobreaño).

Departamento de Río Negro

En esta última semana no han ocurrido precipitaciones. La temperatura durante en las horas de sol es templada, con ocurrencia de algunas heladas agrometeorológicas. La situación de agua de abrevadero para los animales se mantiene sin mayores problemas. Igualmente, se debe prestar atención a este tema. Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje para la época es aceptable, siendo que el crecimiento de las pasturas naturales en esta época comienza a ser muy lento. Pero en general, la situación es buena. Los verdeos y praderas se encuentran en muy buen estado, con buenos aportes de

forraje. La condición corporal en general de los rodeos es muy buena. Las categorías de invernada se ven con un estado muy bueno. En muchos predios se comenzó la suplementación de invierno debido a la pérdida de calidad de las pasturas.

Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario)

Departamento de Tacuarembó

No se registraron precipitaciones entre los días 28 al 3 de junio inclusive. Para la mayoría de las seccionales policiales en el departamento, no existen dificultades de gestión del pasto en los potreros, relacionado con el agua de abrevadero para consumo animal, tanto de tajamares, cañadas, arroyos y de bebederos, **salvo para la 15ª, a juicio de los ganaderos**. Los registros de lluvias de la semana pasada fueron muy útiles para el proceso de implantación y de producción de forraje para los verdeos de invierno y de praderas respectivamente. Las siembras tempranas ya se están pastoreando, la mayoría de las mismas, son de resiembra de raigrás LE284. Las secuelas más severas del déficit hídrico se continúan observando en las seccionales policiales **8ª y 15ª** respectivamente, con altura de forraje de campo natural menor de 3cm de pasto y se registran variaciones negativas (pérdidas de peso vivo) en la condición corporal de bovinos de carne.

Departamento de Rivera

Durante la semana del 28 mayo al 3 junio, no se registraron precipitaciones en el departamento y se formaron heladas asociadas a días muy fríos característicos de la estación. El agua de abrevadero actualmente no es una limitante importante, pero en algunas zonas se encuentra en un nivel mínimo. Los verdeos están entregando forraje y en algunos casos presentan el riesgo aparente de intoxicación por nitratos y nitritos. El campo natural presenta relación verde/seco 50:50, y en amplias zonas del departamento con muy baja disponibilidad. Algunos rodeos presentan disminución del estado corporal. La distribución geográfica del evento déficit hídrico ha afectado grandes áreas de la **7a, 8a, 6 y 5a y en menor proporción áreas de la 2a, 3a y 4ª**, que enfrentarán un invierno con muy pocos recursos forrajeros.

Departamento de Cerro Largo

Durante la semana del 28 al 3 de junio, no se registraron. Se continúa con las particularidades delineadas en el informe anterior (N° 12). Con respecto a las áreas de mejoramientos forrajeros, en aquellos establecimientos ganaderos que se sembraron o de resiembra, comenzaron a pastorearse. No obstante ello, los que se sembraron más tarde, posterior a las lluvias de la semana pasada, se ven con buena densidad de plantas y buen vigor.

Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario)

Departamento de Lavalleja

Como se viene mencionando en informe anteriores la situación en el departamento desde el punto de vista de disponibilidad de forraje y de aguadas viene complicada y se ha ido acentuando. La disponibilidad de forraje del campo natural en general en el departamento es escasa, habiendo situaciones con mejor disponibilidad con algún potrero reservado. Se están realizando los pastoreos de los verdeos y otros están a la espera del crecimiento de los mismos para iniciar los pastoreos. Las praderas existentes son escasas y las que existen tienen poca disponibilidad. Se está suplementando en general recría y rodeo de cría. Las aguadas naturales siguen bajando su cauce y el tema de agua de abrevadero continúa siendo una problemática en muchos establecimientos. Durante esta semana se registraron algunas precipitaciones aisladas de muy pocos mm, que sí bien fueron escasas son oportunas para los verdeos. Las vacas de cría en su mayoría fueron destetadas, quedando excepciones o por falta de agua y/o pasto en los diferentes potreros se encuentran todas las categorías juntas. Se continúan realizando los diagnósticos de gestación obteniendo resultados en general afectados por la situación climática. Los ovinos en general tienen muy buen estado corporal, en general los que hacen esquila preparto ya se están realizando las mismas y aprontando las majadas para el parto.

Departamento de Maldonado

En esta última semana no se registraron lluvias, solamente algunas lloviznas en ciertas zonas del departamento. Comenzaron a producirse las primeras heladas, consideradas leves por los productores.

Con respecto a la situación forrajera en el departamento es la misma que se viene describiendo en informes anteriores, en general es complicada ya que los campos están con baja disponibilidad de forraje y las demás opciones forrajeras como son los verdeos, mejoramientos y praderas vienen muy retrasados en el tiempo. Haciendo referencia a los ganados, la categoría más complicada es la vaca que está preñada y fue destetada tarde con pocas posibilidades actualmente de recuperar estado salvo el uso de una suplementación. Con respecto a la categoría de terneros más livianos y terneras que quedaron en el predio los productores han tomado la decisión de suplementar y otros están esperando por lo menos que los verdeos puedan aportar forraje para esta categoría. El agua disponible para el ganados sigue siendo un tema importante ya que las aguadas no han podido recargarse con las lluvias producidas hasta el momento.

Departamento de Treinta y Tres 3ª y 16ª secc.policial de Cerro Largo

En la última semana no se registraron precipitaciones. Hubo un descenso de temperatura importante y varias heladas. En lo que respecta a lo forrajero, a nivel de campo natural se sigue con escaso remanente, además las heladas y vientos fríos le pegaron duro a lo que quedaba de especies estivales. En campo natural sigue en retroceso tanto en volumen como en calidad. En cuanto a mejoramientos y praderas los crecimientos son lentos. Los verdeos son los que están avanzando mejor y los que tienen, sobretodo sembrados temprano son los que están pudiendo entrar a realizar los primeros pastoreos. El agua para abrevadero, si bien en muchos lugares está lejos de estar bien, con la última lluvia y la baja significativa en la demanda tanto por parte de la atmósfera como de los animales, para muchos dejó de ser un problema. En cuanto al estado de los ganados la situación para muchos sigue compleja, sobre todo a los que tienen como base principal el campo natural y baja o nula cantidad de mejoramientos forrajeros. Acá la principal solución es el alivio de carga, cosa que han adoptado muchos productores, pero el stock forrajero es tan bajo, que la poca carga que quedó en el campo también debe ser atendida vía suplementación, fardos, pastoreo en la calle, etc. Todas estas soluciones se incrementan día a día, los productores van sumando herramientas en la medida que transcurren los días. Las seccionales más complicadas son las que han entrado en la emergencia (**1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 9ª y 10ª**); también parte de la **4ª y 5ª de Treinta y Tres y de la 3ª y 16ª de Cerro Largo**.

Departamento de Rocha

En la última semana no se registraron precipitaciones, las temperaturas bajaron y se registraron las primeras heladas. La situación sigue siendo muy complicada. A nivel de la disponibilidad de forraje la situación continúa agravándose, en lo que es campo natural las pasturas que venían mermando mucho en cantidad pero aún conservaban algo de calidad van perdiendo calidad con los fríos. Apenas quedan algunos potreros con disponibilidad de forraje que en muchos casos obedece a que no pudieron ser pastoreados por falta de agua de bebida. Respecto a praderas han sentido mucho y en la mayoría de los casos están con baja disponibilidad. Los verdeos de raigrás siguen siendo la apuesta fuerte para disponer de algo de pasto y hay una situación muy variada algunos ya se están pastoreando y otros que recién se están sembrando. En cuanto a la disponibilidad de agua para el ganado, las aguadas siguen sin tener recarga por lo que sigue siendo una limitante importante en muchos predios. En cuanto al estado de los ganados continúa desmejorando. Si bien se han tomado medidas de ajustes fuertes de dotación que han tenido buen impacto en bajar la demanda en los predios y poder administrar mejor el poco pasto que queda no son suficientes. Se continúa con los destetes de los ganados paridos más tarde y la suplementación ya empieza a ser generalizada en los predios. Los ovinos en general están en buen estado pero se teme por lo que pueda pasar cuando se aproximen los partos.

Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro)

En esta semana se ha registrado un descenso marcado de las temperaturas durante el día y la noche conforme llegamos al último mes del otoño, también se han registrado heladas agrometeorológicas en todo el territorio de la Regional y está previsto que continúen. El último episodio de precipitaciones fue hace 12 días, con una distribución despereja, por lo que existen zonas de la Regional que se hacen necesarias las precipitaciones para verdeos y praderas. Como ha sido descripto en anteriores informes, existen aguadas naturales y artificiales en situación crítica que las precipitaciones registradas hasta el momento no han permitido su recuperación totalmente.

Campo Natural: conforme avanzamos hacia la estación invernal el campo natural como es característico en este período tiene un crecimiento muy bajo a nulo. **Campo Natural Mejorado:** las condiciones durante el otoño han permitido un buen nacimiento de los mejoramientos. **Praderas:** estas temperaturas bajas, impactan también en la mayoría de las pasturas sembradas, a excepción de los verdeos. Por otro lado, los productores están aprovechando para re-fertilizar las praderas de segundo año. **Verdeos invierno:** En la mayoría de los verdeos ya se han realizado los primeros pastoreos, el ingreso a los segundos está más demorado que otros años, por un menor rebrote de los mismos. Respecto a los **vacunos**, en general la condición está “muy justa” para ingresar al invierno. En invernada, se ve muy poco ganado pronto, se comienzan a aprovechar los pastoreos sobre verdeos.

Comenzando el mes de junio, se vienen registrando condiciones climáticas propias de la entrada a la estación invernal, los productores vienen enfrenado esta situación con bajas disponibilidades de forraje, escasez de reservas y estados corporales “muy justos” de los animales, lo que plantea un escenario con dificultades para pasar el invierno.