

Evolución y análisis mensual de indicadores prediales del Programa Procría perteneciente al mes de Agosto de 2026.

Informe elaborado por el
Plan Agropecuario en
base a datos de **S-Procría**

Panorama comparativo a nivel nacional


Las cuatro variables principales muestran señales distintas. La altura de campo natural cae de forma generalizada entre julio y agosto; la condición corporal también se debilita en todas las regionales, aunque con diferente intensidad; la oferta de forraje se deteriora con fuerza en Región Litoral Norte (RLN), se mantiene en Región Noreste (RNE) y mejora levemente en Región Este (RE); la carga animal cambia poco salvo en Región Noreste (RNE), donde desciende con mayor claridad.

Agosto consolida una reducción de la base forrajera:

- La altura media de campo natural baja de 5,6 a 5 cm (-11%) y la proporción de predios con menos de 3 cm pasa de 9% a 19%.
- La condición corporal también retrocede, de 3,95 a 3,87, y aumenta el grupo con CC <3,5 de 10% a 15%.
- La oferta forrajera cae a 3,36 kg MS/kg PV y 42% de los predios queda por debajo de 3.
- La carga se mantiene relativamente estable (0,82 UG/ha).

Indicador	Julio	Agosto	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo Natural	5,6	5,0	-0,6	-11%	cm
Condición corporal	4,0	3,9	-0,1	-2%	escala 1-8
Oferta de forraje	3,6	3,4	-0,3	-8%	kg MS/kg PV
Carga animal	0,83	0,82	-0,01	-1%	UG/ha


Disponibilidad de campo natural



A nivel nacional, la altura media del campo natural se mantiene en torno a 7 cm entre enero y mayo, con un máximo en abril, y luego muestra una caída sostenida desde junio hasta agosto. En ese tramo se reduce la proporción de predios en los rangos de mayor disponibilidad y aumenta con fuerza el grupo por debajo de 3 cm, que llega a 19% en agosto.

Mes	n predios	Altura media	<3 cm	3-≤5 cm	5-≤9 cm	≥9 cm
Enero	105	7,10	9%	19%	50%	23%
Febrero	223	7,12	8%	26%	39%	27%
Marzo	443	7,28	10%	21%	41%	27%
Abril	405	7,63	4%	17%	50%	28%
Mayo	458	7,41	3%	19%	51%	27%
Junio	435	6,06	10%	27%	49%	14%
Julio	485	5,57	9%	37%	46%	9%
Agosto	348	4,97	19%	35%	41%	5%



Condición corporal de vacas de cría



La condición corporal nacional se mantuvo relativamente estable durante el otoño, con mejores valores entre abril y junio. A partir de julio se observa un deterioro: la media baja a 3,87 en agosto y crece la proporción de predios con vacas por debajo de 3,5, lo que marca una señal de atención para el inicio de la primavera.

Mes	n predios	CC media	<3,5	3,5-≤4	≥4
Enero	92	4,00	14%	25%	61%
Febrero	202	3,95	12%	31%	57%
Marzo	291	3,98	11%	30%	58%
Abril	245	4,05	9%	26%	64%
Mayo	304	4,10	8%	20%	71%
Junio	330	4,06	7%	27%	67%
Julio	427	3,95	10%	33%	57%
Agosto	326	3,87	15%	34%	51%

Oferta de forraje y carga animal



La oferta forrajera mejora hasta abril-mayo, pero desde junio entra en una fase de descenso y alcanza en agosto 3,36 kg MS/kg PV, con 42,3% de los predios por debajo de 3. La carga animal acompaña con una reducción gradual a lo largo del período, aunque entre julio y agosto el cambio es bajo y se mantiene cerca de 0,82 UG/ha.

Mes	n oferta	Media oferta	<3	3-<5	≥5	n carga	Carga media UG/ha
Enero	102	4,50	21%	43%	36%	149	0,92
Febrero	216	4,01	31%	30%	39%	340	0,93
Marzo	433	4,36	29%	29%	42%	554	0,91
Abril	406	5,00	20%	30%	50%	551	0,87
Mayo	457	4,94	18%	33%	49%	572	0,85
Junio	429	3,75	35%	34%	30%	547	0,85
Julio	475	3,64	36%	37%	28%	552	0,83
Agosto	345	3,36	42%	34%	23%	398	0,82

Litoral Norte


Paysandú, Salto, Artigas, Río Negro

Indicador	Julio	Agosto	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	6,5	5,7	-0,7	-11%	cm
Condición corporal	3,9	3,8	-0,1	-2%	escala 1-8
Oferta de forraje	4,3	3,5	-0,8	-19%	kg MS/kg PV
Carga animal	0,83	0,84	+0,005	=	UG/ha

RLN conserva la mayor altura media regional (5,7 cm), pero agosto profundiza la caída: -0,72 cm respecto a julio y 11% de los predios ya queda <3 cm. La señal más fuerte aparece en oferta forrajera, baja de 4,3 a 3,5 kg MS/kg PV (-18,7%), mientras la CC también descende. La carga permanece estable.

Disponibilidad de campo natural

Altura media y porcentaje de predios por rango de altura media.





RLN presenta las mayores alturas de campo natural del período, con valores muy altos entre febrero y abril. Desde mayo comienza una caída sustained hasta agosto; aunque sigue siendo la regional con mayor altura media, aumenta el porcentaje de predios con menos de 3 cm y se reduce el peso de los rangos superiores.

Mes	n predios	Altura media	<3 cm	3-≤5 cm	5-≤9 cm	≥9 cm
Enero	46	7,67	2%	24%	50%	24%
Febrero	86	9,12	1%	15%	36%	48%
Marzo	176	9,26	1%	13%	41%	45%
Abril	151	9,40	0%	11%	41%	48%
Mayo	176	8,66	1%	11%	48%	40%
Junio	145	7,18	1%	21%	54%	23%
Julio	170	6,47	1%	27%	57%	15%
Agosto	101	5,75	11%	34%	45%	10%

Condición corporal de vacas de cría

CC media y porcentaje de predios por rango de CC.




La condición corporal en RLN se mantuvo alta durante enero-mayo, con predominio de predios en el rango ≥ 4 . Desde junio se observa una caída progresiva: en agosto la media baja a 3,85, disminuye el grupo ≥ 4 y crece la proporción de predios entre 3,5 y 4 y por debajo de 3,5.

Mes	n predios	CC media	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	36	4,14	6%	14%	81%
Febrero	61	4,21	2%	16%	82%
Marzo	105	4,17	6%	18%	76%
Abril	87	4,18	8%	11%	80%
Mayo	106	4,15	6%	16%	78%
Junio	121	4,03	4%	31%	65%
Julio	146	3,93	9%	33%	58%
Agosto	87	3,85	13%	40%	47%

Oferta de forraje y carga animal

Oferta media porcentaje de predios por rango de oferta de forraje.



La oferta forrajera de RLN fue alta entre febrero y mayo, incluso por encima de la referencia de 6 kg MS/kg PV en abril, pero luego cae de manera marcada hasta agosto. La carga animal se mantiene relativamente estable y cierra levemente por encima de julio, por lo que el principal cambio regional está en la pérdida de oferta.

Mes	n oferta	Media oferta	<3	3-<5	≥5	n carga	Carga media UG/ha
Enero	48	4,58	12%	50%	37%	64	0,88
Febrero	85	5,62	14%	28%	58%	116	0,88
Marzo	171	5,62	10%	30%	60%	187	0,87
Abril	153	6,13	12%	24%	63%	179	0,87
Mayo	173	5,58	10%	32%	58%	191	0,84
Junio	142	4,46	24%	34%	41%	165	0,85
Julio	166	4,33	25%	39%	36%	175	0,83
Agosto	104	3,52	39%	31%	30%	109	0,84

Litoral Centro


Colonia, Soriano, San José, Florida, Flores, Durazno, Canelones

Indicador	Julio	Agosto	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	4,8	4,4	-0,4	-9%	cm
Condición corporal	3,9	3,9	-0,0	=	escala 1 - 8
Oferta de forraje	3,1	3,0	-0,1	-2%	kg MS/kg PV
Carga animal	0,87	0,86	-0,01	-2%	UG/ha

RLC muestra el ajuste más marcado en disponibilidad: la altura media cae a 4,4 cm y los predios <3 cm suben de 12% a 26%. La CC permanece prácticamente estable (3,93), aunque crece la proporción <3,5. La oferta forrajera se ubica en 3,04, en el límite inferior del rango de referencia invernal, y casi la mitad de los predios (47,6%) está por debajo de 3.

Disponibilidad de campo natural

Altura media y porcentaje de predios por rango de altura media.




En RLC la disponibilidad de campo natural muestra una tendencia descendente desde enero, con una caída más clara entre junio y agosto. En agosto la altura media se ubica en 4,36 cm y aumenta fuertemente el grupo de predios con menos de 3 cm, mientras desaparece prácticamente el rango de mayor disponibilidad.

Mes	n predios	Altura media	<3 cm	3-5 cm	5-9 cm	≥9 cm
Enero	28	7,66	7%	11%	50%	32%
Febrero	63	6,43	5%	30%	49%	16%
Marzo	96	5,52	15%	25%	54%	6%
Abril	104	5,93	9%	22%	63%	6%
Mayo	102	5,65	7%	32%	52%	9%
Junio	116	5,22	9%	39%	47%	6%
Julio	111	4,81	12%	48%	39%	2%
Agosto	103	4,36	26%	36%	38%	0%

Condición corporal de vacas de cría

CC media y porcentaje de predios por rango de CC.




La condición corporal de RLC mejora desde enero hasta mayo, cuando alcanza el mejor valor del período, y luego retrocede levemente hacia agosto. Aunque la media permanece cercana a 3,9, aumenta la proporción de predios con CC menor a 3,5, por lo que el indicador empieza a mostrar una señal de ajuste.

Mes	n predios	CC media	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	28	3,64	21%	46%	32%
Febrero	55	3,73	20%	45%	34%
Marzo	71	3,81	20%	37%	44%
Abril	66	4,00	14%	32%	54%
Mayo	72	4,12	10%	22%	68%
Junio	86	4,04	9%	28%	63%
Julio	101	3,95	12%	30%	58%
Agosto	97	3,93	15%	28%	57%

Oferta de forraje y carga animal

Oferta media porcentaje de predios por rango de oferta de forraje.



La oferta forrajera de RLC se deteriora desde el otoño y cierra agosto en 3,04 kg MS/kg PV, muy cerca del piso del rango invernal; casi la mitad de los predios queda por debajo de 3. La carga animal también baja en forma gradual desde los valores altos de febrero-marzo hasta 0,86 UG/ha en agosto.

Mes	n oferta	Media oferta	<3	3-<5	≥5	n carga	Carga media UG/ha
Enero	26	4,81	15%	38%	46%	32	0,94
Febrero	59	4,02	25%	34%	41%	70	0,99
Marzo	96	3,69	37%	37%	25%	104	0,97
Abril	105	4,41	31%	35%	33%	117	0,90
Mayo	105	3,75	29%	41%	29%	113	0,90
Junio	118	3,23	45%	36%	19%	125	0,88
Julio	114	3,12	45%	38%	17%	118	0,87
Agosto	105	3,04	48%	35%	17%	108	0,86

Noreste


Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó

Indicador	Julio	Agosto	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	5,8	5,3	-0,5	-8%	cm
Condición corporal	3,8	3,7	-0,1	-2%	escala 1-8
Oferta de forraje	3,6	3,6	-0,0	=	kg MS/kg PV
Carga animal	0,86	0,81	-0,05	-6%	UG/ha

RNE combina deterioro de altura y condición corporal. La altura media baja a 5,3 cm y el grupo <3 cm aumenta a 14%. La CC cae a 3,68 y 23% de los predios se ubica por debajo de 3,5, la mayor proporción regional. La oferta forrajera permanece estable en torno a 3,6, mientras la carga baja -6,3%.

Disponibilidad de campo natural

Altura media y porcentaje de predios por rango de altura media.




En RNE la disponibilidad de campo natural tuvo una recuperación importante entre marzo y abril, pero a partir de mayo comienza una caída sustained hasta agosto. El cierre del invierno muestra una altura media de 5,32 cm, con aumento de predios por debajo de 3 cm y menor presencia de situaciones de alta disponibilidad.

Mes	n predios	Altura media	<3 cm	3-<5 cm	5-<9 cm	≥9 cm
Enero	5	7,18	0%	20%	60%	20%
Febrero	22	6,22	0%	45%	36%	18%
Marzo	55	7,58	2%	18%	49%	31%
Abril	55	8,19	2%	2%	64%	33%
Mayo	77	7,84	0%	13%	56%	31%
Junio	72	6,59	7%	18%	62%	12%
Julio	78	5,80	5%	47%	37%	10%
Agosto	49	5,32	14%	31%	51%	4%

Condición corporal de vacas de cría

CC media y porcentaje de predios por rango de CC.




La condición corporal de RNE muestra el deterioro más claro entre las regionales: luego de valores altos al inicio del período, desciende de forma sostenida hasta 3,68 en agosto. Además, aumenta a 23,1% la proporción de predios con CC menor a 3,5, la señal animal más comprometida del monitoreo.

Mes	n predios	CC media	<3,5	3,5-4	≥4
Enero	6	4,75	0%	0%	100%
Febrero	23	4,18	4%	13%	83%
Marzo	43	3,93	9%	28%	63%
Abril	28	4,08	4%	25%	71%
Mayo	46	4,02	11%	11%	78%
Junio	52	3,93	8%	25%	67%
Julio	71	3,77	17%	45%	38%
Agosto	52	3,68	23%	42%	35%

Oferta de forraje y carga animal

Oferta media porcentaje de predios por rango de oferta de forraje.



La oferta forrajera de RNE fue muy variable: baja en febrero, alta en abril-mayo y luego desciende hasta estabilizarse alrededor de 3,6 kg MS/kg PV en julio-agosto. La carga animal, en cambio, muestra una tendencia descendente más clara y cierra agosto en 0,81 UG/ha, con la caída más marcada frente a julio.

Mes	n oferta	Media oferta	<3	3-<5	≥5	n carga	Carga media UG/ha
Enero	5	3,79	20%	40%	40%	9	0,96
Febrero	19	2,85	58%	32%	11%	46	0,96
Marzo	48	4,84	17%	35%	48%	109	0,90
Abril	51	6,12	8%	33%	59%	105	0,89
Mayo	69	6,06	9%	27%	64%	109	0,86
Junio	67	4,04	25%	43%	31%	114	0,85
Julio	73	3,60	33%	44%	23%	106	0,86
Agosto	44	3,59	32%	48%	20%	66	0,81

Este


Lavalleja, Rocha, Maldonado, Treinta y Tres

Indicador	Julio	Agosto	Δ valor	Δ %	Unidad
Campo natural	4,9	4,6	-0,3	-6%	cm
Condición corporal	4,1	3,9	-0,1	-4%	escala 1 - 8
Oferta de forraje	3,3	3,5	+0,1	+4%	kg MS/kg PV
Carga animal	0,78	0,77	-0,00	=	UG/ha

RE mantiene una oferta forrajera dentro del rango invernal y mejora levemente respecto a julio (3,5 kg MS/kg PV), pero la altura de campo natural sigue ajustada (4,6 cm; 22% de los predios <3 cm). La CC baja de 4,09 a 3,94 y el porcentaje con CC <3,5 se duplica aproximadamente. La carga se mantiene prácticamente estable.

Disponibilidad de campo natural

Altura media y porcentaje de predios por rango de altura media.




Mes	n predios	Altura media	<3 cm	3-<5 cm	5-<9 cm	≥9 cm
Enero	26	5,47	23%	19%	46%	11%
Febrero	52	5,04	25%	33%	31%	11%
Marzo	116	5,57	24%	33%	27%	16%
Abril	95	6,33	7%	32%	43%	18%
Mayo	103	6,68	6%	24%	50%	19%
Junio	102	5,04	25%	29%	34%	11%
Julio	126	4,90	20%	34%	41%	5%
Agosto	95	4,61	22%	39%	33%	6%

En RE la disponibilidad de campo natural mejora durante abril y mayo, pero desde junio vuelve a ubicarse en niveles ajustados. Agosto cierra con 4,61 cm de altura media y 22,1% de los predios por debajo de 3 cm, manteniendo una señal de restricción forrajera pese a una leve recuperación del rango ≥9 cm.

Condición corporal de vacas de cría

CC media y porcentaje de predios por rango de CC.




La condición corporal de RE mejora hasta junio, cuando alcanza el valor más alto del período, pero luego retrocede en julio y agosto. La media se mantiene en 3,94, aunque el porcentaje de predios con CC menor a 3,5 aumenta a 13,3%, lo que indica pérdida de estado en una parte del rodeo.

Mes	n predios	CC media	<3,5	3,5-<4	≥4
Enero	22	4,03	23%	23%	54%
Febrero	63	3,80	17%	38%	44%
Marzo	72	3,92	12%	43%	44%
Abril	64	3,92	9%	42%	48%
Mayo	80	4,04	9%	30%	61%
Junio	71	4,21	7%	20%	73%
Julio	109	4,09	6%	27%	67%
Agosto	90	3,94	13%	30%	57%

Oferta de forraje y carga animal

Oferta media porcentaje de predios por rango de oferta de forraje.



La oferta forrajera de RE parte de niveles bajos en verano, mejora durante abril-mayo y vuelve a ajustarse en junio; entre julio y agosto muestra una leve recuperación hasta 3,46 kg MS/kg PV. La carga animal presenta una tendencia descendente durante todo el período y se mantiene prácticamente estable entre julio y agosto.

Mes	n oferta	Media oferta	<3	3-≤5	≥5	n carga	Carga media UG/ha
Enero	23	3,29	43%	35%	22%	44	0,94
Febrero	53	2,83	57%	26%	17%	108	0,92
Marzo	118	2,80	53%	17%	30%	154	0,92
Abril	97	4,29	25%	33%	42%	150	0,82
Mayo	110	4,75	25%	29%	45%	159	0,81
Junio	102	3,05	47%	25%	27%	143	0,81
Julio	122	3,33	43%	29%	28%	153	0,78
Agosto	92	3,46	45%	30%	25%	115	0,77

Mensajes clave de acuerdo a la información de agosto

Región / Nivel	Agosto 2026
Nacional	La principal señal de agosto es el ajuste de la disponibilidad de campo natural: la altura media cae alrededor de 11% frente a julio y casi 19% de los predios queda por debajo de 3 cm. La condición corporal y la oferta acompañan el deterioro, mientras la carga cambia poco.
Litoral Norte	Sigue siendo la regional con mayor altura de campo natural, pero registra una caída fuerte en agosto. La oferta es la variable que más se deteriora: pasa de 4,33 a 3,52 kg MS/kg PV y aumenta significativamente el grupo por debajo de 3.
Litoral Centro	Es la regional con menor altura media de campo natural en agosto y con un fuerte aumento de predios <3 cm. La CC se mantiene casi estable, pero la oferta está muy cerca del piso del rango invernal y casi la mitad de los predios queda <3 kg MS/kg PV.
Noreste	La oferta se mantiene estable, pero la situación animal merece atención: presenta la menor CC media y la mayor proporción de predios con CC <3,5. También cae la carga y aumenta la proporción de predios con alturas <3 cm.
Este	La oferta mejora levemente y la carga se mantiene, pero persiste una base de campo natural ajustada. La CC retrocede y aumenta con fuerza la proporción de predios por debajo de 3,5.