



# **4º Taller Laboratorio**

## **Gestión del Pasto**

### **Establecimiento El Mirador**

### **Río Negro**

### **Flia. Ferro Escanellas**

AUSPICIANTES DE GESTIÓN DEL PASTO



AUSPICIANTES ANUALES DEL PLAN AGROPECUARIO



## **Orden del día**

9:00 – Bienvenida. Ronda de presentación

9:15– Presentación de la actividad

9:30 – Recorrida de campo.

10:30- Regreso al casco.

10:45-Presentación buenas prácticas gestión del pasto

11:15- Ronda de comentarios

12:00- Evaluación y cierre actividad.

|                    | Superficie (ha) |
|--------------------|-----------------|
| <b>Ganadería</b>   | <b>4237</b>     |
| <b>Agricultura</b> | <b>496</b>      |
| <b>Forestación</b> | <b>548</b>      |
| <b>Total</b>       | <b>5281</b>     |

**Tipo de pastoreo:** En el campo natural, se hace un pastoreo continuo, con descansos y reservas de potreros. En los verdeos y praderas se hace un pastoreo rotativo.

## **2) Orientación Productiva:**

**Vacunos:** ciclo incompleto. Venta de novillos de 1 a 2.

**Ovinos:** Ciclo incompleto. Majada de cría cruza Merino Dohne x Highlander (26 micras).

**Agricultura:** En régimen de medianería.

**Forestación:** En régimen de medianería.

## **3) Caracterización del Sistema Productivo:**

### **Vacunos**

Se maneja un rodeo cruza HE x AA

Edad de primer entore: 24 y/o 18 meses.

Fecha de servicio: 15 octubre a 15 noviembre (vaquillonas 24 meses, IA y repaso con toros)

18 noviembre a 1 febrero (vacas 2do entore, IATF y repaso con toros)

11 noviembre a 1 febrero (rodeo general, toros)

Destete: Febrero- marzo.

Peso objetivo destete: 140 kg.

Diagnóstico de gestación: 80%

Vaquillonas 1-2: 77%

Vaca 2 cría: 94%

Rodeo general: cabeza 78%, cuerpo 77%, cola 72%.

### **Manejo de la Recría**

#### **Primer invierno:**

Festuca o verdeos. Suplementación energética.

#### **Segundo Invierno:**

Verdeos

### **Ovinos**

Majada de cría cruza Merino Dohne x Highlander (26 micras)

Fecha de encarnerada: 15/03 al 30/04

Orientación: ciclo incompleto. Venta de cordero pesado

Corderos destetados se van a praderas. Venta de cordero pesado.

#### 4). Resultados físicos y económicos de El Mirador

|                           | 20-21 | 21-22 |
|---------------------------|-------|-------|
| Carne equivalente (kg/ha) | 123   | 157   |
| Carne Vacuna (kg/ha)      | 113   | 144   |
| Carne Ovina (kg/ha)       | 5     | 8     |
| Rel lanar/vacuno          | 0.61  | 0.58  |
| Rel I/P                   | 0.70  | 0.49  |
| IN U\$/ha                 | 58    | 175   |

#### 5). Información de monitoreo Proyecto Gestión del Pasto


Evolución de la dotación, CC, pasto medido e ISCP:

|                  | Inv 21 | Prim 21 | Ver 21 | Oto 22 | Inv 22 | Prim 22 | Ver 22 | Oto 23 | Inv 23 |
|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Dotación UG/ha   | 0,79   | 0,7     | 0,86   | 0,81   | 0,63   | 0,66    | 0,78   | 0,6    | 0.61   |
| CC vacas de cría | 4,5    | 4       | 4      | 3,75   | 4      | 4       | 4      | 4      | 4      |


  

|                 |      |      |        |      |      |      |      |      |        |
|-----------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| Altura de pasto | 3 cm | 5 cm | 2,7 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 3 cm | 5 cm | 5,5 cm |
| Ecografía       | 95%  | -    | -      | 92%  | -    | -    | -    | 80%  | -      |


#### Precipitaciones




Pasto medido




Proporción del área >5 cm de pasto al ingreso de cada estación:



## Stock animal y dotación:



## índice sobre el plato de Comida invierno 2023: 1



\*ISPC invierno 21 está calculado solo en base al CN

## ¿Cuál es el ISPC solo del Campo Natural para invierno?

**1,12**

**Índice (ISPC)**

- Durante el invierno, las categorías que van a quedar en el campo natural son las vacas de cría, toros, vaquillonas, ovejas de cría, borregas y carneros.
- Novillos, terneros/as, corderos y vacas de invernada van a estar en el área mejorada.
- A las vaquillonas de 1 a 2 previo al servicio se les hace un flushing en los mejoramientos.

### **Estrategias tomadas para mitigar efectos de la sequía:**

- Se suplementó con fardo de cola de trilla de trigo a razón de 8 kilos por día y sal proteinada 300 gr por día.
- Instalación de bebederos para llegar potreros sin agua, por ejemplo, en las megatérmicas.
- Ajuste de carga
- IATF a vaquillonas 2do servicio, vacas de cría cabeza y cuerpo.
- Se entablillo terneros de cola de parición por baja CC.
- Se plantó 105 ha de sorgo forrajero en noviembre para los novillos de 1 a 2, y también se suplemento con lupino al 1%.

### **6). Recorrida de campo.**

#### **Parada 1: Lozas forestal**

171 hectáreas CN

266 vacas de cría 2do entore IATF, 94% de preñez.

AI 9/6 5 cm pasto y CC 4

#### **Parada 2: Buena vista**

262 hectáreas, manejada en parcelas de 30 ha.

414 terneras hembras 200 kg promedio

Festuca variedad Fortuna de segundo año. Sembrada a 15 kg/ha.

AI 9/6 10 cm de pasto.