



3º Taller Laboratorio
Gestión del Pasto
Establecimiento El Mirador
Rio Negro
Flia. Ferro Escanellas



Orden del día

14:00 – Bienvenida. Ronda de presentación

14:15 – Presentación de la actividad

14:30 – Recorrida de campo.


15:45- Regreso al casco.

16:00 – Taller- Trabajo en grupos

16:30- Plenario (presentación grupos, 5 minutos c/u) 17:00- Evaluación y cierre actividad

1. Datos Generales.

Uso de suelos:



Índice CONEAT 98

Descripción	Superficie (ha)	%
Pastoreo	4199	81
Agricultura	534	9
Forestación	548	9
Total	5281	100

Pastoreo	Superficie (ha)	%
Campo natural	3397	78
PP1 (festuca)	261	7
PP2 (festuca)	186	5
PP3(festuca)	230	6
PP1 (megatérmica)	45	1
PP2 (paspalum)	15	0
Raigras	65	2
Total	4199	100

Tipo de pastoreo: En el campo natural, se hace un pastoreo continuo, con descansos y reservas de potreros. En los verdeos y praderas se hace un pastoreo rotativo.

En julio 2022 se arrienda un campo (La Flora), 826 ha de campo natural.

2) Orientación Productiva:

Vacunos: ciclo incompleto. Venta de novillos de 1 a 2.

Ovinos: Ciclo incompleto. Majada de cría cruza Merino Dohne x Highlander (26 micras).

Agricultura: En régimen de medianería.

Forestación: En régimen de medianería.

3) Caracterización del Sistema Productivo:

Vacunos

Se maneja un rodeo cruza HE x AA

Edad de primer entore: 24 y/o 18 meses.

Fecha de servicio: 21 junio a 27 julio (vaquillona 18 meses, IA y repaso con toros)

25 octubre al 5 diciembre (vacas 2do entore, IA y repaso con toros)

4 noviembre al 4 enero (cabeza de parición entore, IATF y repaso con toros)

8 diciembre a 8 febrero (cuerpo de parición, IATF, toros)

20 diciembre a 20 de febrero (cola de parición, toros)

Destete: Febrero- marzo.

Peso objetivo destete: 140 kg.

Ovinos

Majada de cría cruza Merino Dohne x Highlander (26 micras)

Fecha de encarnerada: 15/03 al 30/04

Orientación: ciclo incompleto. Venta de cordero pesado

Corderos destetados se van a praderas.

4. Algunos resultados del sistema de producción en el ejercicio 21-22

Dotación promedio: 0,79 UG/ha

Rel. Lanar/Vacuno: 0,58

Producción de Carne Ovina (kg/ha): 8

Producción de Carne vacuna (kg/ha): 144


Producción de carne equivalente (kg/ha): 157

Ingreso neto: 175 U\$S/ha

Relación Insumo/Producto: 0,49

Preñez: 94%


5. Información del monitoreo Proyecto Gestión del Pasto.




Evolución de la dotación, CC, pasto medido e ISPC

	Invierno 21	Primavera 21	Verano 21	Otoño 22	Invierno 22	Primavera 22
Dotación UG/ha	0,79	0,7	0,86	0,81	0,63	0,66
CC vacas de cría	4,5	4	4	3,75	4	4

Altura de pasto	3 cm	5 cm	2,7 cm	4 cm	4 cm	4 cm
-----------------	------	------	--------	------	------	------




Ispc invierno 21 considera solo el campo natural.
 Ispc primavera 22 considera además el campo arrendado (La Flora).



Tasa de crecimiento del campo natural en El Mirador:


Productividad Mensual Total
 desde oct. 21 hasta sep. 22



Estrategia del sistema:

Durante los meses de otoño- invierno- primavera, se mantiene el campo natural con muy baja carga, concentrando las categorías de recría e invernada en las praderas y verdeos.

En verano se cierran las áreas de mejoramiento y se pasan todas las categorías a las áreas de campo natural. Excepto las 15 ha de paspalum, 45 ha megatérmica y este año se tiene pensado sembrar 105 ha de sorgo forrajero para los novillos de 1 año, los cuales serán suplementados con lupino (producido en el mismo predio) para que la punta salga en el próximo otoño.




*FRD: Forraje rápidamente disponible.

¿Cuánto pasto habrá el 1/12 en el CN cuando entre todo el ganado?

	15 de octubre en el CN
Dotación UG/ha	0,34
Ispc	1,14
Pasto medido cm	3,2
Pasto requerido cm	2,3

Utilizando el MEGANE, una herramienta que permite simular distintos escenarios:

Clima normal para nov- dic:




1/12:

4.86 cm de pasto disponible

5.4 cm de pasto requerido

Ispc= 0.9 (90% del plato de comida)

Clima seco para nov- dic (produce un 40% menos):



1/12:

4.15 cm de pasto disponible

5.4 cm de pasto requerido

Ispc= 0.76 (76% del plato de comida)

Recorrida de campo:

Parada 1: Cerrillada

242 ha campo natural

Al 15/10: 3 cm de pasto, vacas con CC 4.

319 vacas de cría.

Fecha de parición: 30/8 al 30/9

8/12 IATF

Estuvieron todo el año en campo natural (Cerrillada, Monte, Potrero 1). Suplementadas con sal proteicas y minerales.

Parada 2: Forestal Lozas chico

Al 15/4: 5,4 cm de pasto

Vaquillonas de 1 año.

Se destetaron a principios de febrero, 120 kg.

Ultima pesada el 6/10 218 kg.

Ganancia diaria dentro de las festucas fue 0,7 kg/día.

Desde que se destetaron, estuvieron sobre las festucas, julio/agosto pasaron por una avena, y luego campo natural.

Taller

- 1. ¿Cómo ven esta estrategia para gestionar el pasto?**
- 2. ¿Si se cumplen los pronósticos de seca, que haría de diferente y por qué?**

