


Establecimiento “María Auxiliadora” de Marcel Rodríguez

El campo se encuentra con baja disponibilidad de forraje, tanto en verdeos, praderas como en los bajos de campo natural. Se pastorearon las praderas de forma continua debido a problemas de electricidad de las parcelas.



Se aplicó herbicida selectivo en algunos potreros, lográndose un buen control de malezas.

Estos sectores del campo presentan un alto grado de enmalezamiento, principalmente en la zona más superficial del campo. Las malezas más frecuentes son Senecio (*Senecio Selloi*) y Carnicera (*Conyza bonariensis*).



Hay 13 ha de cebada con trébol rojo que se van a cortar para hacer silo pack. Se perdieron casi 4 ha de este forraje debido al exceso hídrico.



Se mandaron muestras de suelo para determinar los niveles de potasio y fósforo de las pasturas.

N° LAAI	Identificación Proporcionada	Parámetro (unidad)	
		Fósforo Bray I (ppm P)	Potasio Int. (meq. K/100g)
146357-1	LOTE A	13	0.47
146357-2	LOTE B	9	0.41
146357-3	LOTE C	5	0.27
146357-4	LOTE D	4	0.28
146357-5	LOTE E	6	0.35
146357-6	LOTE F	10	0.51
146357-7	LOTE G	19	0.69

Se decidió corregir los niveles de fósforo en los sectores que tienen menos de 10 ppm, elevarlos hasta 10 inicialmente y los niveles de potasio corregir los sectores que les hace falta.

Stock y pesos al 09/10/17

Categoría	Cantidad	UG	Peso/animal/destarado*	Kg totales	Potrero	Área	Pastura	Suplementación
Vacas de invernada	115	115	396	45.540	Sector C	75	Pradera	
Novillos	212	212	438	92.856	Sectores FDE	150	Pradera y raigrás	
Vaq Holando	7	7	300	2.100	Sector A		Pradera	
Terneritas	320	176	208	66.560	Sectores ABG	105	Pradera	Fardos y ración
TOTAL	654	510		207.056		330		

*6% de destare sobre peso de campo.

La superficie de pastoreo son 330 ha. La dotación actual es de 1.55 UG/ha. La carga es de 627 kg/ha.

Ternereras

Hay 300 ternereras pastoreando en 72 ha de pradera y 33 ha de bajos. Están siendo suplementadas con fardos y ración en comederos de autoconsumo. La ración la arman en el propio predio en el mixer, con maíz partido, núcleo vitamínico – mineral, cáscara de soja y fardo.

Se les realizó análisis coprológico y de cultivo.

Se prevé pastorear los sectores donde están las ternereras de forma rotativa con 3 días de ocupación y 24 de descanso.

Desde la última pesada el 7/08/17, ganaron 550 g/animal/día.



Novillos

Están pastoreando sobre praderas y verdeos sin suplementación.

Al haber poca disponibilidad de forraje y que hay solo un camión de novillos prontos (gordos), se planea la venta de 100 novillos más livianos, de manera de bajar la dotación. A su vez se saca margen por los kilos ganados y con la diferencia de precios entre la compra y la venta.

Desde la última pesada el 07/08/17 los novillos mantuvieron su peso hasta la fecha, no se registraron ganancias.

Vacas de invernada

Están pastoreando sobre praderas y verdeos sin suplementación. Se prevé la venta de las vacas gordas.

Desde la última pesada el 07/08/17 las vacas mantuvieron su peso.